

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES ASOCIADOS A PREECLAMPSIA EN
GESTANTES ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE
GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REZOLA-
CAÑETE ; JULIO – DICIEMBRE 2016.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

KRISTY GISELA MONDRAGÓN CHULES

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores asociados a Preeclampsia más frecuentes en gestantes atendidas en el Hospital Rezola-Cañete; Julio–Diciembre 2016. Es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 pacientes con diagnóstico de Preeclampsia que correspondía el 100 % de la población.

Este trabajo se realizó desde julio a Diciembre del 2016, en el departamento de Gineco - obstetricia, para la cual se empleó como instrumento la ficha de recolección de datos para obtener información de las historias clínicas y de la base de datos brindada por el servicio de estadística, toda la información recolectada se incorporó en una base de datos del paquete estadístico SPSS Versión 22, previa codificación. Para la fiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach.

Resultados: La incidencia de la preeclampsia es de 5 % .El tipo de preeclampsia más frecuente fue la preeclampsia severa. Los factores asociados a preeclampsia más frecuentes fueron: la procedencia de zona rural; La nuliparidad; el IMC ≥ 35 . En cuanto al antecedente familiar de preeclampsia se identificó que el antecedente familiar de preeclampsia sí es un factor frecuente en el Hospital Rezola Cañete; Julio–Diciembre 2016.

PALABRAS CLAVE: Incidencia , Factores ,Preeclampsia.