

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES ASOCIADOS A LESIONES PRE
MALIGNAS Y MALIGNAS DE CANCER CERVICO
UTERINO EN MUJERES DE 30-49 AÑOS DEL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 2015
LIMA- PERU.**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

STEPHANIE MILUSKA ANGULO NOBLECILLA

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

El cáncer cervical es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres en el Perú. Objetivo: Determinar los factores asociados a lesiones premalignas y malignas a nivel de Cuello Uterino. Método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal con una muestra de 21 registros, correspondientes a informes de Papanicolaou, con diagnóstico de lesiones epiteliales de alto grado y carcinoma invasor (malignas) en cuello uterino, procesadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en el año 2015. Resultados: Las edades oscilaban entre 30 - 49 años. Las lesiones pre malignas presentaron una frecuencia de 16 casos (44.44%) y 5 casos con diagnóstico de carcinoma invasor (13.89%). Además se encontraron 12 pacientes (57.14%) que usaron métodos anticonceptivos asociados a lesiones premalignas y malignas; La multiparidad encontrada en 21 pacientes (100%) fue el más alto de los factores asociados en nuestro estudio. Promiscuidad como asociación a lesiones malignas y pre malignas se encontró en 4 pacientes (19.05%); antecedentes familiares 1 positivos (4.76%) y controles previos de PAP solo en 2 pacientes (9.53%). Conclusión: Los resultados obtenidos en el presente estudio guardan algunas coincidencias con los reportados en otros estudios y lo descrito en la literatura médica, sin embargo, es importante la realización de otros estudios de mayores proporciones para determinar la frecuencia verdadera de estas lesiones en nuestro medio.

Palabras claves: factores asociados, cáncer cervicouterino, lesiones pre malignas y malignas.