


**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA RUPTURA  
PREMATURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO 22 Y 34 SEMANAS  
DE EDAD GESTACIONAL  
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL CARLOS  
LANFRANCO LA HOZ  
ENERO-DICIEMBRE, 2015**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER  
NEYCER BERROSPI TOCAS**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL  
DE MEDICO CIRUJANO**

**LIMA-PERÚ  
2016**

## RESUMEN

La finalidad de este estudio es determinar la frecuencia de los factores de riesgo materno para ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMpt) entre las 22 y 34 semanas de edad gestacional, así como conocer su incidencia en RPM en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz durante el periodo enero-diciembre, 2015, enfocados a sus variables gineco-obstetricas, demográficas, para así tener un concepto amplio sobre las principales causas que originan esta patología.

Para obtener la información de las variables en este estudio, se utilizó una ficha técnica de recolección de datos (ver Anexo N° 03 ).las cuales incluyen número de Historia Clínica, fecha de ingreso, fecha de egreso, controles prenatales, edad, peso Materno,edad Gestacional x Ultima regla (UR)y/o Ecografia Obstétrica, infección cérvico-vaginal-urinario / trimestre, Metrorragia ,polihidramnios, incompetencia cervical, presentación fetal Cirugía Gineco-obstétrica previa, embarazo Múltiple,tabaquismo y tiempo de RPM al diagnóstico. El tamaño de la muestra fue de 73 Paciente con diagnóstico de RPM comprendida entre 22 y 34 semanas de edad gestacional atendidas el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, enero-diciembre,2015. El procesamiento de datos de la información se realizó de la siguiente manera; después de haber culminado con la recolección de datos en el instrumento de recolección, los datos recolectados fueron ingresados a

una hoja de cálculo en el programa Excel® 2012, para ser procesado posteriormente a través del Paquete Estadístico SPSS versión 20.

De los 73 casos estudiados; La frecuencia de los factores de riesgo materno para ruptura prematura de membranas pretérmino entre las 22 y 34 semanas de edad gestacional en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz enero-diciembre 2015 son: Infección cérvico-vaginal-urinario 62 %, control prenatal insuficiente 60%, RPM anterior 7 %, peso bajo 5.4%, antecedente de metrorragia 5%, gestación múltiple 3%. Solo se encontró un caso de polihidramnios .No hubo ningún caso registrado de gestante con presentación fetal distinta a la cefálica ni incompetencia cervical, ninguna con antecedentes de procedimiento gineco-obstetrico, ni que fuma cigarrillos. Del total de las gestantes que presentaron Infección cérvico-vaginal-urinario el 80% fue por infecciones del tracto urinario.

La edad gestacional media fue de 28,81 semanas. En cuanto tiempo de RPM mayor de 24 horas 24%. El grupo etario más afectado son las gestantes entre 20 y 35 años con un 81%.La incidencia de RPM pretérmino entre las 22 y 34 semanas de edad gestacional es de 1.51%.