

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE OVARIO  
POLIQUÍSTICO EN ADOLESCENTES  
HOSPITALIZADAS EN EL SERVICIO DE  
GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL  
HIPÓLITO UNANUE, ENERO-DICIEMBRE DEL 2015**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
MARIA LUCIA ROJAS COPACONDORI  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MEDICINA HUMANA**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar la prevalencia del Síndrome de Ovario Poliquístico en adolescentes hospitalizadas en el servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Enero-Diciembre del 2015.

**METODOLOGÍA:** La investigación fue un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño observacional de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo debido a que se recopiló información proveniente de las historias clínicas, de las pacientes hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Según el propósito el estudio será de tipo Descriptivo porque se expondrán las características clínicas relevantes de la muestra. La población objeto de estudio está conformada por pacientes adolescentes con y sin síndrome de ovario poliquístico hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Enero a Diciembre del 2015.

**RESULTADOS:** Luego de analizar las 55 pacientes se concluye que la prevalencia de Síndrome de Ovario poliquístico es del 29% en adolescentes hospitalizadas en el servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. De acuerdo al intervalo de edad se encontró que la prevalencia de SOP es del 41% en adolescentes que se encontraban en la adolescencia tardía. La prevalencia de SOP es mayor en adolescentes que tuvieron la menarquia a los 10 años (50%). La prevalencia de SOP es mayor en las adolescentes que tuvieron régimen catamenial irregular (57%). La prevalencia de SOP es mayor en adolescentes que no tuvieron trastornos menstruales (29%). La prevalencia de SOP es mayor en adolescentes sin hijos (33%). La prevalencia de SOP es mayor en adolescentes con obesidad tipo I (100%). La prevalencia de SOP es mayor en adolescentes con antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico (80%). La

prevalencia de SOP es mayor en adolescentes con ecografía que indica síndrome de ovario poliquístico (89%).

**CONCLUSIÓN:** La prevalencia del SOP es alta en adolescentes hospitalizadas en el servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Enero-Diciembre del 2015. La frecuencia de desarrollar SOP es mayor en la adolescencia tardía. El IMC se encontró ligeramente elevado en las adolescentes con SOP. La menarquía en las adolescentes con SOP se presentó con mayor frecuencia entre los 10 y 12 años de edad. Se determinó que la mayoría de adolescentes con SOP no presentaba este antecedente familiar de SOP.

**PALABRAS CLAVES:** Síndrome de Ovario poliquístico, adolescentes características clínicas.