

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL  
DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA EN  
GESTANTES DE 25 A 40 AÑOS EN EL SERVICIO DE  
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL  
HIPOLITO UNANUE EN EL AÑO 2015**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER**

**KATHERYNE NATHALY NARCISA SARTORI TORRES**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE**

**MEDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERU**

**2016**

## RESUMEN

En el presente estudio se busca identificar los factores de riesgo asociados al Desprendimiento Prematuro de Placenta en gestantes de 25 a 40 años en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2015.

Se revisaron 45 historias clinicas de gestantes diagnosticadas con esta patologia dentro de la edad, periodo de tiempo y lugar que comprende esta investigacion. Se utilizo una ficha de recoleccion de datos donde se expresan: Datos generales (Edad, estado civil, grado de instruccion, nivel socioeconomico); Datos obstetricos (Paridad, edad gestacional, antecedente de desprendimiento prematuro de placenta, traumatismo abdominal, control prenatal, cesareas previas, legrados uterinos previos); Comorbilidad materna (Hipertension cronica, Preeclampsia, hipertension inducida por el embarazo, anemia materna, ruptura prematura de membranas, diabetes mellitus, miomatosis uterina, polihidramnios); y Habitros nocivos (consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaina).

En esta investigacion se identifico como el factor de riesgo mas importante la hipertension arterial inducida por el embarazo, seguido de rotura prematura de membranas, y en tercer lugar anemia materna.