

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DEL PRIMER  
TRIMESTRE DEL EMBARAZO EN EL HOSPITAL  
NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 2014.**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER**

**KARLA DANIELA HERNANDEZ MATHEWS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima. Objetivo: Determinar la frecuencia de las complicaciones obstétricas del primer trimestre del embarazo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el año 2014. Metodología: Es un estudio descriptivo, de corte transversal no experimental, se utilizó una ficha de recolección de datos para obtener 259 historias clínicas del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014. Resultados: La complicación obstétrica más frecuente en el primer trimestre de embarazo fue la amenaza de aborto (37%), seguido respectivamente por el aborto (27%), hiperémesis gravídica (14%), infección del tracto urinario bajo (ITU) (13%) y solo un 9% de pacientes que acudieron por más de 1 complicación. La edad más frecuente estuvo en rango de 18 a 29 años (56%), seguida por la población adulta de 30 a 59 años (41%), a diferencia de los de 12 a 17 años que solo fueron el (3%), ninguna de las que acudieron tuvieron 11 años o menos. Las semanas de gestación con las que se presentaron de manera más frecuente fue de 6 a 10ss (70%). El grado de instrucción de las gestantes que predominó fue las que contaban solo con educación secundaria (53%), seguidas respectivamente con las de educación superior (29%), educación primaria (16%) y solo el 2% eran analfabetas. Las primigestas que presentaron complicaciones en el primer trimestre de embarazo fueron el 26%, superada por las no primigestas con el 74%. Y las que no tuvieron ni un solo control prenatal fueron el 81% de las gestantes sacando gran ventaja

al 19% que fueron las que tuvieron uno o más controles hasta las 12 semanas.

**Palabras claves:** Complicaciones obstétricas, primer trimestre de embarazo, amenaza de aborto, aborto, infección del tracto urinario bajo (ITU) , hiperémesis gravídica, primigesta, control prenatal.