

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO PARA EMBARAZO ECTÓPICO
EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL
HIPÓLITO UNÁNUE DURANTE EL AÑO 2015.**

TESIS

**PRESENTADO POR LA BACHILLER
RUBI ANDREINA HUAMÁN SÁNCHEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

Título: Factores de riesgo para embarazo ectópico en mujeres atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unánue durante el año 2015.

Objetivo: Determinar los factores de riesgo para embarazo ectópico en mujeres atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unánue durante el año 2015.

Material y métodos: Estudio de corte transversal, descriptivo, retrospectivo, se revisaron historias clínicas de pacientes con embarazo ectópico con la finalidad de identificar la incidencia, las características clínicas, los factores de riesgo ginecológicos y obstétricos, el método diagnóstico usado y la semana de gestación al diagnóstico de las pacientes con embarazo ectópico.

Resultados: Se encontraron una incidencia de 0,62%, los factores de riesgo significativos en función de embarazo ectópico previo fueron la edad de inicio de las relaciones sexuales, el antecedente de aborto, enfermedad pélvica inflamatoria, uso de DIU; y no significativos como multiparidad. El método diagnóstico más usado fue la ecografía siendo la ubicación más frecuente la tubárica.

Conclusiones: Las pacientes con embarazo ectópico previo; antecedente de aborto; cirugía abdomino-pélvica previa; antecedente de uso de DIU, enfermedad pélvica inflamatoria, aquellas con 2 – 3 parejas sexual se encuentran asociadas e influyen a la presentación del embarazo ectópico; además coincide con la literatura revisada.

Palabras clave: Embarazo ectópico, factores de riesgo, enfermedad de transmisión sexual (ETS), dispositivo intrauterino (DIU).