

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**SOBREPESO Y OBESIDAD COMO FACTORES ASOCIADOS AL PARTO
CESÁREA EN GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DURANTE LOS AÑOS
2018 Y 2019**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

CALDERÓN ALCÁNTARA JOSEPH HOOBERT

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2020

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar si el sobrepeso y obesidad son factores asociados al parto cesárea en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales entre los años de 2018 – 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de tipo cuantitativo, analítico, observacional, de casos y controles y retrospectivo, cuya muestra está constituida por 274 gestantes adolescentes con sobrepeso y obesidad (IMC>25) siendo 137 casos y 137 controles. Se excluyeron gestantes con IMC < de 25. En el estudio se utilizó una ficha de recolección de datos. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS V22, se aplicó la prueba de Chi Cuadrado, tomando valores de $p < 0,05$ para la significancia estadística y se calculó el OR con un intervalo de confianza al 95%.

RESULTADOS: Las pacientes obesas tienen 7,01 veces el riesgo de tener cesárea con (IC95% 3,46 – 14,20); el tener una cesárea anterior presenta 20,33 veces el riesgo de tener parto cesárea, con un índice de confianza de 95% de (1,17 – 352,88). El presentar control prenatal inadecuado incrementa 2,55 veces el riesgo de tener parto cesárea, con un intervalo de confianza de 95% de 1,53 – 4,25 con un $p < 0,001$ demostrando que si hay asociación estadística significativa.

CONCLUSIÓN: La obesidad, la cesárea anterior y el control prenatal inadecuado son factores asociados al parto cesárea en gestantes adolescentes.

PALABRAS CLAVE: Sobrepeso, Obesidad, Cesárea, Adolescentes, Gestante.