

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**OBESIDAD INFANTIL COMO FACTOR ASOCIADO A CRISIS ASMATICA  
DE MODERADA A SEVERA INTENSIDAD DEL HOSPITAL BARRANCA  
CAJATAMBO 2018-2019**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER**

**QUINTANILLA POZO EDUARDO ANDY**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2020**

## RESUMEN

**Objetivo:** Analizar la obesidad infantil como factor asociado a crisis asmática de moderada a severa intensidad en el Hospital Barranca Cajatambo 2018-2019.

**Materiales y métodos:** Es una investigación observacional, analítico, de corte transversal, retrospectivo. La población fue 136 pacientes pediátricos con obesidad que presentaron crisis asmática de modera a severa intensidad. La recolección de datos se realizó mediante la ficha de recolección de datos para el análisis estadístico donde se empleó el programa Microsoft Excel y SPSS versión 25.

**Resultados:** Se observó la obesidad infantil como factor asociado a crisis asmática con un valor de significancia de  $X^2=92,445$  y un valor  $p=0,000$ ; La edad con valor significativo de  $X^2=14,926$  y un valor  $p=0,001$ ; el género con valor significativo de  $X^2=6,978$  y un valor  $p=0,008$ ; la actividad física un valor significativo de  $X^2=47,190$  y un valor  $p=0,000$ ; se encontró la crisis asmática moderada en un 69,1% de los obesos infantiles y crisis severa en un 30,9% de los infantes con obesidad.

**Conclusiones:** La obesidad infantil es un factor asociado para la crisis asmática de moderada a severa intensidad, mientras más obeso sea el infante mayor severidad en crisis asmática.

**Palabras claves:** *Obesidad Infantil, crisis asmática.*