

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A EMBARAZO
ECTÓPICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL
PERIODO 2019**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

ESTEFANY FIORI CERAS ROJAS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2020

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a embarazo ectópico en pacientes atendidas en el Hospital María Auxiliadora 2019.

Material y métodos: Se incluyeron 106 pacientes de las cuales 53 fueron parte de los casos y 53 de los controles. Se elaboro un estudio de diseño no experimental, de tipo analítico, transversa, observacional y retrospectivo. Para relacionar los factores de riesgo asociados a embarazo ectópico se utilizo la prueba no paramétrica de Chi cuadrado, con un $p < 0,05$ y los datos fueron trasladados al paquete estadístico SPSS versión 25 para su análisis y valoración.

Resultados: De los 106 pacientes incluidos en el estudio (53 casos y 53 controles) se hallaron como factores de riesgo asociado a embarazo ectópico a las siguientes: enfermedad de trasmisión sexual 71,7% (38 casos) con un OR: 10,893 IC: 4,379 – 27,101, embarazo ectópico previo 34,0% (18 casos) con un OR: 13,114 IC: 2,860 – 60,136, aborto inducido anterior 5,7% (3 casos) con un OR: 2,060 IC: 1,689 – 2,513, dispositivo intrauterino 43,4% (23 casos) con un OR: 3,297 IC: 1,372 – 7,922 , todas esas variables presentan un $p < 0,005$ (0,000) determinando que existe diferencia significativa entre las variables.

Conclusión: Se determino la asociación entre los factores de riesgo ginecológicos y obstétricos con el embarazo ectópico.

Palabras clave: Factores asociados, embarazo ectópico.