

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES OBSTETRICOS ASOCIADOS A ANEMIA EN GESTANTES
QUE ACUDEN AL CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA ANITA
DURANTE EL AÑO 2019**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

BERTO INGA, ERIKA CAROL

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA - PERÚ

2021

DEDICATORIA

Dedicado a mis padres, por ser mi fortaleza y el motivo de seguir adelante cada día y poder llegar a ser profesional gracias a ellos; además de su amor y apoyo incondicional brindado en todo momento.

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores obstétricos asociados a la anemia en gestantes que acuden al Centro Materno Infantil Santa Anita durante el año 2019

MATERIALES Y METODOS: Es un estudio de tipo observacional, retrospectivo, de corte transversal y analítico, de tipo casos y controles. Nivel explicativo. Para ello se contó con una muestra de 86 gestantes con anemia (casos) y 86 gestantes sin anemia (controles) conformando un tamaño muestral de 172 gestantes. Los datos se obtuvieron mediante una ficha de recolección de datos y luego procesada en el programa SPSS versión 25, usando la prueba χ^2 para determinar la asociación y el valor de OR con su IC 95% para la ocurrencia de probabilidad de dicha entidad.

RESULTADOS: La mayoría de gestantes se encontraban en el I trimestre, con anemia, en un 37.2%, y las que no tenían, en un 45.3%. De los factores obstétricos se determinó que la anemia en gestantes está asociada al factor edad materna ($p=0,009$; $OR=2.2$), con un 61.6% y 2.2 veces más la probabilidades de desarrollar esta las menores a 30 años; el factor multiparidad ($p=0,02$; $OR=2$) con un 63.9 % y 2 veces más la probabilidades de desarrollo; y el periodo intergenésico corto ($p=0,005$; $OR=2.4$) con un 51.2 % y 2.4 veces más la probabilidades. Sin embargo, el sobrepeso ($p=0,127$; $OR=0.62$) y el antecedente de abortos ($p=0,620$; $OR=1.178$) no guardo relación significativa con la anemia en gestantes ni asociación.

CONCLUSIONES: Los factores obstétricos asociados a la anemia en las gestantes fueron la edad menor de 30 años, la multiparidad y el periodo intergenésico corto; sin embargo, el sobrepeso y los abortos previos no lo fueron.

PALABRAS CLAVES: Edad, multiparidad, periodo intergenésico corto, sobrepeso y abortos.

ABSTRACT