

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A LA ICTERICIA EN EL RECIÉN
NACIDO A TÉRMINO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO,
2018 – 2019**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
LAUREANO VARILLAS ELIZABETH MIRIAM**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores maternos asociados a la ictericia en el recién nacido a término del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2018 - 2019.

MÉTODO Y MATERIALES: Es un estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo y de corte transversal. La muestra se halló a través de la fórmula EpiDat cuyo resultado fue de 100 recién nacidos vivos a término (RNVT) donde se encontraron 50 RNVT para casos y 50 RNVT para controles en el periodo julio del 2018 - junio del 2019 del servicio de Neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Toda la información fue obtenida mediante una ficha de recolección de datos y procesada a través del programa SPSS Versión 25 y Excel 2013.

RESULTADOS: Según los resultados obtenidos se pudo identificar qué factores maternos tuvieron una asociación significativa con la ictericia en el recién nacido a término, en cuanto a la edad materna las madres mayores de 35 años tuvieron un OR= 1,875, $p= 0,045$, en la incompatibilidad ABO se llegó a obtener un OR= 5,263, $p= 0,018$, en el tipo de parto se obtuvo un $p = 0,014$, OR: 3,187 y en cuanto al tipo de paridad la asociación fue de $p= 0,023$ OR: 6,471.

CONCLUSIONES: En este estudio se llegó a encontrar una asociación significativa entre la ictericia con los factores maternos asociados como: la edad de la madre, la incompatibilidad ABO, el tipo de parto y el tipo de paridad, los cuales aumentan el riesgo en el recién nacido a término.

Palabras claves: Ictericia, incompatibilidad ABO, factores maternos.