

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**COMPLICACIONES MATERNAS ASOCIADAS A LA INFECCIÓN DEL
TRACTO URINARIO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD DE GUADALUPE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
ESPINO RAMIREZ JACK JOSE**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

ICA – PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Relacionar las complicaciones maternas a las infecciones del tracto urinario en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Guadalupe de enero a diciembre del 2020.

Metodología. Estudio de tipo cuantitativo, transversal, observacional, retrospectiva, de diseño casos y controles en 66 gestantes con infección urinaria comparadas con 132 gestantes sin infección urinaria, evaluando las complicaciones asociadas a la infección del tracto urinario como son la amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de membranas y sepsis materna.

Resultados: 51.5% (34) gestantes con infección urinaria presentaron amenaza de aborto, mientras que las gestantes que no presentaron infección urinaria la amenaza de aborto se presentaron en el 15.2% (20). El 25.8% (17) en las gestantes que tuvieron infección urinaria, mientras que la proporción de las que no presentaron amenaza de parto pretérmino en el grupo de las gestantes sin infección urinaria es de 10.6%. El 30.3% (20) de las gestantes con infección urinaria presentaron ruptura prematura de membranas, mientras que las gestantes que no tuvieron infección urinaria el 12.1% (16) presentaron rotura prematura de membranas. Las gestantes con infección urinaria el 6.1% (4) presentaron sepsis materna, mientras que el 0.8% (1) de las gestantes sin infección urinaria presentaron sepsis materna.

Conclusiones: La amenaza de aborto está asociada a la infección del tracto urinario en gestantes incrementando el riesgo hasta 5.9 veces más. La amenaza de parto pretérmino está asociada a la infección del tracto urinario en gestantes incrementando el riesgo hasta 2.9 veces más. La rotura prematura de membranas está asociada a la infección del tracto urinario en gestantes incrementando el riesgo hasta 3.1 veces más. La sepsis materna está asociada a la infección del tracto urinario en gestantes incrementando el riesgo hasta 8.5 veces más.

Palabras clave: Complicaciones maternas, infección urinaria gestantes.