

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS A CESÁREA EN PRIMIGESTAS DEL  
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES, LIMA 2020**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
LEÓN VILCHEZ JHOANNA LISSETH**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2021**

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar los factores asociados a cesárea en primigestas del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Lima 2020.

**MATERIALES Y MÉTODOS:** Estudio tipo cuantitativo, observacional, analítico, transversal, retrospectivo, tipo casos y controles no emparejados. La población estuvo conformada por 848 primigestas y la muestra por 326 primigestas divididas en 163 casos (primigestas que culminaron su gestación por cesárea) y 163 controles (primigestas que culminaron su gestación por parto vaginal) atendidas en el Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. El instrumento empleado fue ficha de recolección de datos y la técnica fue el análisis de contenido, se utilizó el programa SPSS versión 25 para el procesamiento de datos; muestreo empleado fue de tipo probabilístico aleatorio simple sin reposición.

**RESULTADOS:** La prevalencia de cesárea en primigestas del Hospital Nacional Sergio E. Bernales fue 41.98% durante el 2020.

Se demostró estimación de riesgo estadísticamente significativo con la cesárea en primigestas para los siguiente factores: **Factores maternos:** Distocia de pelvis (OR: 8.15, IC95%: 1.83-36.28, p: 0.001), trastorno hipertensivo del embarazo (OR: 8.15, IC95%: 1.83-36.28, p: 0.003), Obesidad pregestacional (OR: 1.6, IC95%: 1.83-36.28, p: 0.04), Condilomatosis genital