

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES ASOCIADOS A HERNIAS INGUINALES EN LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL
REZOLA - CAÑETE EN EL PERÍODO 2019

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER:

VARGAS QUIJANDRIA MAYRA

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

MÉDICO CIRUJANO

CHINCHA – PERÚ

2021

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo asociados a hernias inguinales en pacientes atendidos en el Departamento de Cirugía General del Hospital Rezola - Cañete en el período 2019

MATERIALES Y MÉTODOS: Es un estudio de tipo analítico, observacional, transversal, retrospectivo y de tipo casos y controles. Se contó con una muestra de 204 pacientes, 102 casos (pacientes con diagnóstico de hernia inguinal) y 102 controles (pacientes sin diagnóstico de hernia inguinal).

RESULTADOS: La edad de los participantes fue en su mayoría entre 41-60 años, la mayoría de sexo femenino (116 participantes). De los participantes con hernia inguinal el 40.2% eran mayores de 60 años, el 61.76% pertenecían al sexo masculino y el 64.71% padecían obesidad. Dentro de las características de la hernia, el tipo de hernia más frecuente fue la hernia directa (84.31%), de ubicación derecho (76.74%) y unilateral (86.27%). El estudio encontró asociación entre hernia inguinal y sexo masculino con un OR = 1.87 (1.22-2.88) ($p=0.004$), no se encontró asociación significativa con respecto a otras variables.

CONCLUSIONES: En este estudio se encontró que el sexo masculino es el único factor de riesgo estadísticamente significativo para hernia inguinal. La edad, estado nutricional, cirugía previa, constipación y EPOC no presentaron asociación significativa.

PALABRAS CLAVES: Hernia inguinal, factores de riesgo, casos y controles.