

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES PERIOPERATORIOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE
HERNIAS DE TROCAR EN PACIENTES POSTOPERADOS DE
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN EL HOSPITAL DE VITARTE
DURANTE EL PERIODO 2016-2019.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
HUAPAYA SALAZAR KAROL PATRICIA**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Analizar los factores perioperatorios presentes en el desarrollo de hernias de trocar en pacientes postoperados de colecistectomía laparoscópica en el hospital de Ate vitarte durante el periodo 2016-2019.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo, de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 29 pacientes postoperados de colecistectomía laparoscópica en el hospital de vitarte durante el período 2016-2019, de los cuales, cumplieron los criterios de selección establecidos. Los datos obtenidos fueron procesaron mediante el programa Excel y para su análisis se aplicó el test de Chi cuadrado.

Resultados: Los factores perioperatorios presentes en el desarrollo de hernias de trocar en pacientes postoperados de colecistectomía laparoscópica fueron: El tamaño del lito " $\geq 1\text{cm}$ " [52%<>15; $p=0.002$] y la morbilidad postoperatoria "ninguna" [62%<>18; $p=0.011$].

Conclusión: La presente investigación determinó que los factores perioperatorios presentes en el desarrollo de hernias de trocar en pacientes postoperados de colecistectomía laparoscópica en el hospital de Vitarte durante el periodo 2016-2019 fueron el tamaño del lito ($p<0.020$), y morbilidad postoperatoria ($p<0.007$).

Palabras clave: Hernia de trocar, factores perioperatorios, características epidemiológicas.