

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA NECESIDAD DE CESÁREA
DE EMERGENCIA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE
VENTANILLA, 2020.**

PRESENTADA POR BACHILLER

QUINTANA CERDAN, CARMEN MARGOTH

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a la necesidad de cesárea de emergencia en pacientes atendidas en el Hospital de Ventanilla durante el periodo octubre a diciembre del 2020. Para lo cual, se realizó un estudio de tipo observacional, analítico de casos y controles, transversal, retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 164 gestantes (82 casos y 82 controles), seleccionados a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se empleó como instrumento una ficha de recolección de datos y para determinar los factores de riesgo asociados se calculó el Odds ratio con un nivel de confianza del 95%; adicionalmente se analizó descriptivamente las variables. La muestra se caracterizó por una edad promedio de 27,2 años, de raza mestiza (92,1%), grado de instrucción secundaria (71,3%) y casadas (68,9%). Ningún factor sociodemográfico demostró aumentar significativamente el riesgo de necesidad de cesárea de emergencia. Sin embargo, algunos factores gestacionales tales como el sufrimiento fetal (OR:2,6; IC 95%: 1,2-5,4), posición fetal de nalgas (OR:2,0; IC 95%: 1,7-2,4), de hombros (OR:23,4; IC 95%: 3,0-180) y prematuridad (OR:12,8; IC 95%: 1,6-102) si incrementaron dicho riesgo en 2,6; 2,0; 23,4 y 12,8 veces, respectivamente. Por otro lado, los aspectos clínico-patológicos de cesárea anterior (OR:17,4; IC 95%: 5,8-52,1) e infección de tracto urinario (OR:6,0; IC 95%: 3,0-12,0) aumentaron el riesgo en 17,4 y 6 veces. Se concluye que el sufrimiento fetal, posición fetal de nalgas y hombros, prematuridad, cesárea anterior e infección de tracto urinario son factores de riesgo que incrementan la necesidad de cesárea de emergencia.

Palabras clave: Cesárea de emergencia, Factores sociodemográficos, Factores gestacionales, Aspectos clínico-patológicos. (DeCS)