

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A PARTO PREMATURO EN
GESTANTES HOSPITALIZADAS EN EL SERVICIO DE GINECO-
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA
DURANTE EL PERIODO 2019-2020**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
SÁNCHEZ ARTEAGA LEIDY MARISOL**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA- PERÚ

2021

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores maternos asociados a parto prematuro en gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital José Agurto Tello de Chosica durante el periodo 2019-2020.

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal, analítico tipo casos y controles. Utilizándose un total de 196 historias clínicas las cuales estuvieron conformadas por 98 casos de pacientes con parto prematuro y 98 controles. Se calculó mediante el programa SPSS versión 25, la prueba no paramétrica de chi cuadrado que nos permitió medir la asociación mediante el OR E IC 95%.

RESULTADOS: No existen factores maternos sociodemográficos asociados a parto prematuro ($p > 0.05$). Existen hábitos nocivos maternos asociados a parto prematuro, como la ingesta de alcohol (OR=4.854, IC95% 1.021-23.078) y fumar tabaco (OR=4.419, IC95% 1.206-16.186). Asimismo, los factores maternos obstétricos asociados a parto prematuro, son no contar con un control prenatal adecuado (<6 controles) (OR=12.542, IC95% 6.242-25.201), tener antecedentes de parto prematuro (OR=6.409, IC95% 2.110-19.465). Además, existen factores maternos patológicos asociados a parto prematuro, por ejemplo, la infección del tracto urinario (OR=4.728, IC95% 2.035-10.988), la preeclampsia (OR=3.333, IC95% 1.339-8.300), la anemia materna (OR=3.956, IC95% 1.753-8.924) y la ruptura prematura de membrana (OR=6.085, IC95% 2.953-12.538).

CONCLUSIONES: Existen factores maternos significativos ($p \leq 0.05$) asociados a hábitos nocivos, obstétricos y patológicos que elevan el riesgo de parto prematuro en gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital José Agurto Tello de Chosica durante el periodo 2019-2020.

Palabras Clave: parto prematuro, factores maternos, sociodemográficos, hábitos nocivos, obstétricos, patológicos.