

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES CLINICOS, EPIDEMIOLOGICOS Y ABORTO  
INCOMPLETO EN MUJERES INMIGRANTES ATENDIDAS EN EL  
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO ENERO - SETIEMBRE 2020,  
LIMA - PERU**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**RUEDA ROJAS LISSY KOLLANTAY**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  
MEDICINA HUMANA**

**LIMA – PERÚ**

**2021**

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar los factores clínicos y epidemiológicos relacionados con el aborto incompleto en las mujeres inmigrantes atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho durante el periodo enero a setiembre del 2020. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio observacional, transversal, retrospectivo y de diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 297 pacientes gestantes inmigrantes con diagnóstico de aborto atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho, la muestra calculada para una población finita fue de 132 pacientes mujeres inmigrantes con diagnóstico de aborto, las mismas que formaron parte del estudio y cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión determinados en el presente proyecto. El instrumento fue una ficha de recolección de datos. **RESULTADOS:** Los tipos más frecuentes de aborto en pacientes inmigrantes atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho son el aborto incompleto con un 89,4%, el aborto completo 9,1% y por al aborto sin especificación con un 1,5%; los factores clínicos relacionados al aborto incompleto en las pacientes inmigrantes atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho, son paridad multigesta Rho de Spearman 0,316 y p valor 0,0021; edad gestacional menor de 12 semanas Rho de Spearman 0,411 y p valor 0.0017; uso de anticonceptivos método de barrera Rho de Spearman 0,389 y p valor 0,0001 y el habito nocivo consumo de alcohol Rho de Spearman 0,571 y p valor 0,0001; los factores epidemiológicos relacionados al aborto incompleto son edad materna de 20 a 34 años Rho de Spearman 0,474 y p valor 0,0013; ocupación ama de casa Rho de Spearman 0,511 y p valor 0,0336; el estado civil conviviente Rho de Spearman 0,422 y p valor 0,0123; el presentar violencia intrafamiliar Rho de Spearman 0,336 y p valor 0,0023; nivel socioeconómico bajo Rho de Spearman 0,337 y p valor 0,0290; debemos de expresar que los resultados evidencian una correlación directa positiva con el aborto incompleto. **CONCLUSIONES:** Los factores clínicos y epidemiológicos