

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN  
GESTANTES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE  
GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO  
LOAYZA DEL PERIODO DE ENERO DE 2019 A AGOSTO DE 2019**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**NAUPAY ROMERO INES JUDIT**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFECIONAL**

**MEDICO CIRUJANO**

**LIMA-PERU**

**2022**

## RESUMEN

**OBJETIVO:** determinar los factores asociados a las complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes que acuden al servicio de ginecología-obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del periodo de enero a agosto del 2019.

**METODOLOGÍA:** El estudio es de tipo observacional, diseño analítico de casos y controles, retrospectivo, se realizó en un hospital de tercer nivel con una muestra de 171 gestantes adolescentes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia durante enero-agosto del 2019, las cuales se dividieron en dos grupos; 57 que presentaron alguna complicación obstétrica durante el embarazo (grupo casos) y 114 que no presentaron complicaciones (grupo controles), se elaboró una ficha de recolección de datos para la recopilación de la información acerca de las características sociodemográficas y gineco-obstétricas plasmadas en la historias clínicas de las gestantes. Luego con la información se realizó un análisis bivariado. Para las variables cuantitativas se aplicó el Chi – cuadrado de Pearson, para establecer si existe asociación entre estas, con un valor significativo si  $P < 0.05$ ; para las variables cualitativas se realizó el análisis descriptivo de frecuencia.

**RESULTADOS:** Las gestantes adolescentes presentaron como complicaciones obstétricas más frecuentes la anemia materna (40%), la infección de las vías urinarias (30.9%), Preeclampsia (10.9%). Se encontró asociación significativa entre los siguientes factores sociodemográficos y las complicaciones obstétricas; el grado de instrucción secundaria completa ( $P=0.017$ ) (OR=0.4) (IC 95%: 0.192-0,862), la convivencia ( $P=0.026$ ) (OR: 2.3) (IC 95%:1.096-4.859). Asimismo, se encontró asociación significativa entre los factores gineco-obstetricos y las complicaciones obstétricas, el número de gestaciones, de estas la segunda gestación en las adolescentes ( $P=0.03$ ) (OR: 0.2) (IC95%: 0.91-0.66), tipo de parto por cesárea ( $P=0.00$ ) (OR: 0.2) (0.123-0.550), número de controles prenatales igual o mayor a 6 ( $P=0.00$ ) (OR=4.2) (IC95%: 2.146-8.251).

**CONCLUSIÓN:** Los factores sociodemográficos asociados a las complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes son el grado de instrucción secundaria completa y el estado civil convivencia. Asimismo, los factores gineco-obstétricos asociados, son el número de gestaciones, siendo el de mayor riesgo las gestantes con segunda gestación, el tipo d parto por cesaría y el número de controles prenatales mayor o igual a 6.

**PALABRAS CLAVES:** Factores asociados, gestantes adolescentes, complicaciones obstétricas.