

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS Y OBSTETRICOS QUE  
INFLUYEN EN LA DEPRESIÓN PUERPERAL DEL HOSPITAL  
NACIONAL HIPÓLITO UNANUE – 2019**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**ARROYO HUAYNATTY MERY**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2022**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los aspectos sociodemográficos y obstétricos que influyen en la depresión en puérperas del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo de Agosto a Setiembre del 2019

**Materiales y Métodos:** Estudio descriptivo, correlacional de corte prospectivo, transversal, con una muestra de 339 madres, Se aplicó la escala de depresión post-parto de Edimburgo y de acuerdo a ello se analizó la probabilidad del riesgo, se dividió a la población en pacientes con depresión y sin depresión, ambos grupos fueron relacionados con los aspectos sociodemográficos y obstétricos , para el análisis los datos estadísticos se utilizó SPSS25 para calcular las frecuencias y la significancia, además de una prueba de regresión logística binaria para la relacionar los aspectos con la depresión.

**Resultados:** El 54 % (183) de las puérperas presento mayor probabilidad depresión post parto y la edad promedio es de 20– 34 años con 53.7 %(132), dentro de los aspectos sociodemográficos tenemos que el lugar de procedencia con mayor casos es el Agustino presentando 66 puérperas (53.7%) , el estado civil es conviviente con 131 (54.4%) puérperas , el grado de instrucción es la secundaria con 134 (62.3%) puérperas , la ocupación es ser ama de casa con 137 (54.2%) puérperas ., el hacinamiento se dio en 103 puérperas (59.5%) .Dentro de los aspectos obstétricos, la edad gestacional fue ser a termino con 102 (52%) puérperas ,las cesáreas son 116(58.3%) puérperas, las multíparas son 127 (55.2%) puérperas ,presencia de abortos previos 39.30% (72), el periodo intergenésico corto 14 (50.5%) , no planificación del embarazo 61,2% (112).Sin embargo en la regresión logística binaria se consideraron los aspectos como el hacinamiento , grado de instrucción y embarazo planificado.

**Conclusión:** Los riesgos sociodemográficos y obstétricos si presentaron significancia, dentro de los sociodemográficos tenemos el estado civil ( p – valor 0.003) , el hacinamiento ( p – valor 0.03), grado de instrucción ( p – valor 0.000) y dentro de los obstétricos el único que mostro significancia es el embarazo planificado ( p – valor 0.011).

**Palabras Clave:** Depresión postparto, Puerperio , Correlacional , Sociodemográfico , Obstétrico .