

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS RELACIONADOS A
LA ANSIEDAD POR COVID-19 EN PACIENTES QUE ACUDEN AL
CENTRO MATERNO INFANTIL ACAPULCO – CALLAO. PERÍODO
AGOSTO – DICIEMBRE 2021**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

RODRÍGUEZ FUENTES RIVERA KATIUSKA ZOBEBY

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA-PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores sociodemográficos y clínicos relacionados a la ansiedad por COVID-19 en pacientes que acudieron al Centro Materno Infantil Acapulco - Callao en los meses de agosto a diciembre del 2021.

Metodología: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal de tipo correlacional, la población consistió en todos los pacientes que acudieron al servicio de respuesta rápida de COVID-19 en el periodo de agosto a diciembre del 2021, teniendo un total de 297 pacientes de los cuales solo participaron de esta investigación 198 pacientes; asimismo, se empleó una ficha de recolección de datos y el programa SPSS para la investigación estadística.

Resultados: Se puede observar que del total de encuestados el 76.3% son de sexo femenino; asimismo, la mayoría de la muestra corresponde a población económicamente activa con un 63.6 %, el 58.6 % cuenta con dos o más hijos. Por otro lado, el 32.8 % de la población tiene síntomas depresivos clínicamente significativos, el 30.8% síntomas ansiosos clínicamente significativos y el 35.4 % síntomas somáticos clínicamente significativos. El 8.6 % de la población presentó ansiedad a la COVID-19. Existe una correlación entre la escala de depresión (PHQ-9), la escala de ansiedad (GAD-7) y la escala de síntomas somáticos (PHQ-15) respecto a la ansiedad a la COVID-19.

Conclusiones: Existe relación entre la ansiedad por la COVID-19 y la presencia de síntomas ansiosos, depresivos, somáticos y el tener una enfermedad previa, esto nos podría indicar que al ser una población vulnerable por los antecedentes que tienen son más propensos a generar ansiedad por el coronavirus y la situación de la pandemia.

Palabras clave: Ansiedad, COVID-19, Cuestionario de salud del paciente PHQ-9, GAD-7, síntomas somáticos. (Fuente DeCS BIREME)