

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN AL DESGARRO PERINEAL
EN GESTANTES QUE ASISTEN AL CENTRO MATERNO INFANTIL MÉXICO
EN EL PERIODO 2020 – 2021**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

VACAS ESPINO KATHERIN ROSARIO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2022

RESUMEN

OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores de riesgo que predisponen al desgarro perineal en gestantes que asisten al Centro Materno Infantil México en el periodo 2020 – 2021.

MÉTODOS Y MATERIALES: Se ejecutó un estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo de caso y control. La información fue recopilada a través de historiales médicos, se incluyó 162 pacientes de las cuales 61 fueron casos y se contó con 61 controles. Se utilizó el programa SPSS versión 25, para el análisis de los datos, la prueba no paramétrica chi cuadrado y OR con un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS: Los factores de riesgo que predisponen al desgarro perineal en esta investigación son: los factores obstétricos como intergenésico largo (≥ 5 años) [$p < 0,004$; OR=2,663], controles prenatales $< 6CP$ [$p < 0,026$; OR=2,170], con respecto a los factores maternos, se halló que las primíparas [$p < 0,011$; OR=2,263], pacientes ≥ 35 años, [$p < 0,001$ OR=3,184]. En los factores neonatales, las pacientes que tuvieron un recién nacido con un peso $\geq 4000g$ [$p = 0,039$; OR=1,940], perímetro cefálico ≥ 35 cm [$p < 0,028$; OR=2,013], talla $\geq 50cm$ [$p = 0,001$; OR=3,184], y sexo del recién nacido [$p = 0,115$].

CONCLUSIONES: Los factores asociados a los desgarros perineales en el Centro Materno Infantil México en el periodo 2020 – 2021, fueron las pacientes que presentaron un intergenésico largo (≥ 5 años), $< 6CP$, ser primípara, tener más 35 años, tener un recién nacido con un peso $\geq 4000g$, perímetro cefálico ≥ 35 cm y talla ≥ 50 cm, no se encontró relación estadísticamente significativa con el sexo del recién nacido.

PALABRAS CLAVE: Desgarro perineal, factores de riesgo, factores obstétricos, factores maternos, factores neonatales.