

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PROLAPSO DE ÓRGANOS  
PÉLVICOS EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL  
DANIEL ALCIDES CARRIÓN-CALLAO DEL 2018 AL 2020

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

PAUCAR ALBENGRIN KARLA XILENE

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2023**

## RESUMEN

Aproximadamente el 11% de las mujeres del Perú sufren del prolapso de los órganos pélvicos, este mal se debe a diversos factores los cuales todavía no están bien definidos, por lo cual, en esta investigación se estudia los factores de riesgo asociados al prolapso de órganos pélvicos. **Objetivo:** Determinar los factores de riesgo asociados al prolapso de órganos pélvicos en mujeres atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-Callao del 2018 al 2020. **Material y método:** No experimental, cuantitativo, analítico de casos y controles, retrospectivo y transversal. **Resultado:** Se estudió 96 historias clínicas de las cuales fueron 48 casos y 48 controles. Donde los factores de riesgo para prolapso de órganos pélvicos son: la edad avanzada, las pacientes de “> 60 años” presentaron un OR=3,462 (IC95% 1,473-8,137) y  $p=0,0038$ . La raza, donde las pacientes de raza blanca presentaron un OR=5,571 (IC95% 1,190-21,276) y  $p=0,0062$ . Estado nutricional, las pacientes con obesidad presentaron un OR=4,3333 (IC95% 1,7278-10,8679) y  $p=0,0013$ . La paridad donde las pacientes con “>5 Hijos” presentaron un OR=3,496 (IC95% 1,425-8,579) y  $p=0,005$ . Antecedentes de histerectomía presentó un OR de 3,182 (IC95% 1,356-7,467) y  $p=0,007$ . **Conclusión:** Los factores de riesgo para prolapso de órganos pélvicos en nuestro estudio fueron la edad avanzada “>60 años”, raza blanca, antecedentes de obesidad IMC  $\geq 30$ , antecedentes de paridad “> 5 hijos” y antecedentes de histerectomía.

**Palabra clave:** Factores de Riesgo, Prolapso de Órgano Pélvico, Mujeres, Histerectomía, Paridad, Obesidad.

# INFORME ANTIPLAGIO



## Document Information

Analyzed document	PAUCAR ALBENGRIN Karla Xilene Tesis final.docx (D143271968)
Submitted	8/26/2022 5:00:00 AM
Submitted by	Victor Pulido
Submitter email	victor.pulido@upsjb.edu.pe
Similarity	0%
Analysis address	victor.pulido.upsjb@analysis.arkund.com

## Sources included in the report

### Entire Document

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA  
CARÁTULA FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-CALLAO DEL 2018 AL 2020  
TESIS PRESENTADA POR BACHILLER PAUCAR ALBENGRIN KARLA XILENE  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO  
LIMA – PERÚ  
2022

ASESOR: VICTOR MANUEL PULIDO CAPURRO  
AGRADECIMIENTO Agradezco a Dios, a

mis padres por brindarme la oportunidad de cumplir mis metas, y a mi asesor de tesis quien me acompañó en ese último paso para la elaboración de esta investigación.

DEDICATORIA A mis padres y hermanos, quienes me acompañaron y ayudaron en todo el proceso de mi carrera. A mi ángel Corina, que desde el cielo me ilumina para seguir adelante con mis proyectos.

#### RESUMEN

Aproximadamente el 11% de las mujeres del Perú sufren del prolapso de los órganos pélvicos, este mal se debe a diversos factores los cuales todavía no están bien definidos por lo cual en esta investigación se estudia los factores de riesgo asociados al prolapso de órganos pélvicos.

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al prolapso de órganos pélvicos en mujeres atendidas en el Hospital

Nacional Daniel Alcides Carrión-Callao del 2018 al 2020.

Material y método: No experimental, cuantitativo, analítico de casos y controles, retrospectivo y transversal. Resultado: Se estudió 96 historias clínicas de las cuales fueron 48 casos y 48 controles. Donde los factores de riesgo para prolapso de órganos pélvicos son: la edad avanzada, las pacientes de "60 años" presentaron un OR=3,462 (IC95% 1,473-8,137) y p=0,0038. La raza, donde las pacientes de raza blanca presentaron un OR=5,571 (IC95% 1,190-21,276) y p=0,0062. Estado nutricional, las pacientes con obesidad presentaron un OR=4,3333 (IC95% 1,7278-10,8679) y p=0,0013. La paridad donde las pacientes con "5 Hijos" presentaron un OR=3,496 (IC95% 1,425-8,579) y p=0,005. Antecedentes de histerectomía presentó un OR de 3,182 (IC95% 1,356-7,467) y p=0,007. Conclusión: Los factores de riesgo para prolapso de órganos pélvicos en nuestro estudio fueron la edad avanzada "60 años", raza blanca, antecedentes de obesidad IMC  $\geq 30$ , antecedentes de paridad "5 hijos" y antecedentes de histerectomía.

ABSTRACT



INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

**NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:**

KARLA XILENE PAUCAR ALBENGRIN

**TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:**

- MONOGRAFÍA nb )
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA nb )
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN nb )
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN nb )
- PROYECTO DE TESIS nb )
- TESIS nb X )
- OTROS nb )

---

**INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO): 0 %**

FACTORES ASOCIADOS AL PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-CALLAO DEL 2018 AL 2020.

**COINCIDENCIA: 0 %**

**Conformidad Investigador:**

Nombre: Karla Xilene Paucar Albengrin

DNI: 72472565

Huella:



**Conformidad Asesor:**

Nombre: Víctor Manuel Pulido Capurro