

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



**NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES
REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ.**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

CASTRO ILLESCAS VERONICA SHEYLA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CIRUJANO DENTISTA**

LIMA – PERÚ

2023

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD PÚBLICA

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD PÚBLICA ESTOMATOLÓGICA

ASESOR:

MG. ESP. HERNÁN RAFAEL CACHAY CRIADO

CASTRO ILLESCAS VERONICA SHEYLA

ORCID:

0000-0002-4809-8049

AGRADECIMIENTO

A mi asesor el Dr. Hernán Rafael Cachay Criado por compartir conmigo sus conocimientos, experiencias y poder guiarme en cada paso de este estudio.

Agradezco a todos aquellos que de alguna u otra manera me brindaron su apoyo en este estudio de inicio a fin.

DEDICATORIA

A Dios, por haberme dado la fuerza y perseverancia para continuar adelante
para cumplir mis sueños.

A mi madre y hermano, ya que, con su comprensión y apoyo incondicional,
me han permitido llegar hasta esta etapa tan importante de mi carrera
profesional.

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú. **Materiales y métodos:** El presente estudio es de tipo analítico, transversal, prospectivo, observacional y nivel relacional. La muestra estuvo compuesta por 100 pacientes rehabilitados con prótesis dental removible atendidos durante el periodo comprendido entre el año 2020 al 2022 en una clínica odontológica privada de Lima-Perú. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios GOHAI y OHIP-EDENT, validados y autoadministrados. Para determinar la relación se empleó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson ($p < 0,05$). **Resultados:** Prevalció el nivel moderado de satisfacción con 65,0% y el nivel alto de calidad de vida con 76,0% en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible. El nivel de satisfacción según las características sociodemográficas prevaleció el nivel moderado en el grupo etario de 30 a 44 años, seguido de la prótesis parcial removible con 70,0% y el género femenino con 67,2%. El nivel de calidad de vida según las características sociodemográficas prevaleció el nivel alto en el grupo etario de 30 a 44 años, seguido de la prótesis parcial removible con 76,7% y el género femenino con 79,7%. **Conclusión:** Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.

Palabras claves: Satisfacción, calidad de vida, prótesis dental, salud bucal.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the level of satisfaction and quality of life in patients rehabilitated with removable dental prosthesis in a private dental clinic in Lima-Peru. **Materials and methods:** The present study is analytical, cross-sectional, prospective, observational and relational level. The sample consisted of 100 rehabilitated patients with removable dental prostheses treated during the period from 2020 to 2022 in a private dental clinic in Lima-Peru. The instruments used were the GOHAI and OHIP-EDENT questionnaires, validated and self-administered. Pearson's Chi-square test ($p < 0.05$) was used to determine the relationship. **Results:** The moderate level of satisfaction prevailed with 65.0% and the high level of quality of life with 76.0% in patients rehabilitated with removable dental prosthesis. The level of satisfaction according to the sociodemographic characteristics prevailed the moderate level in the age group of 30 to 44 years, followed by the removable partial prosthesis with 70.0% and the female gender with 67.2%. The level of quality of life according to the sociodemographic characteristics prevailed the high level in the age group of 30 to 44 years, followed by the removable partial prosthesis with 76.7% and the female gender with 79.7%. **Conclusion:** There is a significant relationship between the level of satisfaction and quality of life in patients rehabilitated with removable dental prosthesis in a private dental clinic in Lima-Peru.

Keywords: Satisfaction, quality of life, dental prosthesis, oral health.

ÍNDICE

• CARÁTULA	I
• LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	II
• ASESOR	III
• AGRADECIMIENTO.....	IV
• DEDICATORIA.....	V
• RESUMEN	VI
• ABSTRACT	VII
• ÍNDICE	VIII
• REPORTE TURNITIN	X
• INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS	XI
• LISTA DE TABLAS.....	XII
• LISTA DE ANEXOS	XIII
1. INTRODUCCIÓN	14
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	16
2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	17
3. HIPÓTESIS.....	29
3.1 HIPÓTESIS GENERAL.....	29
4. VARIABLES	29
4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA(S) VARIABLE (S)	29

4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA (S) VARIABLE (S).....	30
5. OBJETIVOS.....	30
5.1 OBJETIVO GENERAL	30
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	30
6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	31
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO.....	31
6.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	31
6.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	32
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA	32
6.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL Y MUESTREO	32
6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN.....	32
6.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS	33
6.6 PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	34
6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO	36
7. RESULTADOS.....	37
8. DISCUSIÓN	43
9. CONCLUSIONES	48
10. RECOMENDACIONES.....	49
11. BIBLIOGRAFÍA	50
12. ANEXOS.....	57

REPORTE TURNITIN

Castro Illescas Verónica Sheyla-NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	12%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
3	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repository.usta.edu.co Fuente de Internet	1%
8	Submitted to Universidad Privada de Tacna Trabajo del estudiante	1%

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA

INFORME DE VERIFICACIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO

FECHA: 16 DE JUNIO 2023

NOMBRE DEL AUTOR (A) / ASESOR (A):

CASTRO ILLESCAS VERONICA SHEYLA / MG. ESP. CACHAY CRIADO HERNÁN RAFAEL

TIPO DE PROINVESTIGACIÓN:

- PROYECTO ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- TESIS (X)
- TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL ()
- ARTICULO ()
- OTROS ()

INFORMO SER PROPIETARIO (A) DE LA INVESTIGACIÓN VERIFICADA POR EL SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN, EL MISMO TIENE EL SIGUIENTE TÍTULO: "NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ."

CULMINADA LA VERIFICACIÓN SE OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE: 24%

Conformidad Autor:

Nombre: Castro Illescas Veronica Sheyla

DNI: 75545729

Huella:



Conformidad Asesor:

Nombre: Mg. Esp. Cachay Criado Hernán Rafael

DNI: 09304637

LISTA DE TABLAS

- Tabla 1. Relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.....38
- Tabla 2. Nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima – Perú39
- Tabla 3. Nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.....40
- Tabla 4. Nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas41
- Tabla 5. Nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas42

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	57
ANEXO 2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL.....	59
ANEXO 3. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA.....	60
ANEXO 4. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	61
ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO	62
ANEXO 6. INSTRUMENTO	64
ANEXO 6a. CUESTIONARIO 1	64
ANEXO 6b. CUESTIONARIO 2	69
ANEXO 7. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO	74
ANEXO 8. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS	75
ANEXO 9. MATRIZ DE CONSISTENCIA	93

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El edentulismo es una condición de la salud oral definida como la falta de piezas dentales, la cual puede dividirse en dos categorías: parcial y total.¹

Esta condición se encuentra directamente asociado con una calidad de vida reducida debido a que afecta la función masticatoria, la interacción social y el bienestar psicológico; llegando a perjudicar la vida diaria de las personas. Por lo tanto, al conocer la importancia del sistema estomatognático, comprendemos el impacto de la salud bucal en la calidad de vida de las personas.²

En Latinoamérica, los estudios llevados a cabo indican que la prevalencia de edéntulos parciales o totales se aproxima al 40% poblacional, un elevado porcentaje que se incrementa con la edad, siendo las personas más afectadas de 60 años o más.³

Asimismo, diversos estudios realizados en el Perú han reportado que existe una alta prevalencia de edentulismo parcial y total, debido a distintos factores como: la economía, acceso limitado a los servicios básicos de salud, desinformación o desconocimiento sobre prevención en salud, factores sociales, etc.⁴

En cuanto al tratamiento rehabilitador se dará mediante el uso de prótesis dentales, que pueden sustituir una arcada desdentada completa y se conocen como prótesis total removible, o sustituir áreas desdentadas parcialmente

conocidas como prótesis parcial removible. Teniendo como objetivo principal mejorar en el paciente no solo la masticación, estética, fonética sino también su calidad de vida.⁵

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida como “la percepción que tiene un individuo de su situación de vida, en el contexto sociocultural y los valores en los que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, estándares e intereses, donde a su vez se vincula con diferentes factores”.⁶

La calidad de vida relacionada con la salud bucal, cuando se ve afectada, puede generar ciertas complicaciones físicas, psicológicas y sociales, lo que dificulta que una persona realice actividades esenciales como dialogar o alimentarse, además de disfrutar la vida misma. Por ello, la salud bucal es un componente fundamental de la salud general ya que influye significativamente en la calidad de vida de las personas.⁷

Con respecto a la satisfacción es la percepción que tiene el paciente sobre el resultado del tratamiento rehabilitador y las expectativas que tenía al inicio y las que puedan manifestarse posteriormente. La satisfacción y la mejora de la salud bucal es el objetivo final que se busca lograr tras la finalización del tratamiento rehabilitador, lo cual causará un importante bienestar en el paciente.⁸

Por lo descrito anteriormente, es de gran importancia evaluar la satisfacción del paciente, lo cual contribuirá a considerar como exitoso el tratamiento

protésico, ayudando así a mejorar la calidad de vida de los pacientes portadores de prótesis removibles.⁹

Por lo cual, el “propósito de este estudio fue determinar la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima – Perú”.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú?

2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

En el 2022, Ruiz.¹⁰ desarrolló una investigación cuyo objetivo fue el análisis de la conexión entre el bienestar bucal y el nivel de vida de las personas que se someten a tratamiento de recuperación oral en una Clínica Dental en Lima. Su muestra estuvo compuesta por un total de 117 pacientes mayores de 65 años, los datos fueron recopilados mediante los instrumentos: GOHAI y el OHIP-14. Como resultados se obtuvo que un 79% fueron del género femenino, también se encontraron diversas asociaciones, como: la dimensión función masticatoria y psicosocial, función masticatoria y dolor, función estética y dolor. En conclusión, ambas variables de estudio se correlacionaron ya que las prótesis les permitieron comer, hablar e interactuar con diferentes personas de su entorno.

En el 2022, Ferre.¹¹ elaboró un estudio, con el objetivo de identificar la influencia del tratamiento protésico en la calidad de vida del adulto mayor en un centro especializado de Chiclayo. La muestra incluyó a 50 participantes, se recopiló mediante el índice GOHAI en modalidad online. Los resultados fueron los siguientes: 36% de calidad de vida, lo que indica un nivel regular. Se halló que los pacientes entre las edades de 60 a 69 años tenían una calidad de vida buena. No hubo diferencia significativa entre el género y la calidad de vida del paciente. Se concluye que este estudio favoreció a este grupo de población ya que tuvo resultados significativos en la calidad de vida del adulto mayor.

En el 2022, Oweis y col.¹² elaboraron una investigación con el objetivo de comparar la satisfacción del paciente con las prótesis dentales completas proporcionadas por estudiantes de odontología y prostodoncistas en una Universidad de Jordan. Se distribuyó el cuestionario EVA y el OHIP-EDENT versión árabe en 60 pacientes. Como resultados encontramos que la destreza del odontólogo no perjudica la satisfacción con la prótesis dental completa en el paciente. Los pacientes que poseían sus prótesis dentales anteriores se adaptaron mejor, mostrando más satisfacción con sus nuevas prótesis instaladas, especialmente con relación a su capacidad de masticación y comodidad con sus prótesis mandibulares. El género afectó mayormente la satisfacción del paciente enlazada con la discapacidad psicológica y social. Los investigadores concluyeron que los pacientes presentaron una alta satisfacción con las prótesis dentales completas.

En el 2022, Couto y col.¹³ desarrollaron un estudio para analizar la calidad de vida asociada con la salud oral de individuos edéntulos antes y después de la rehabilitación con prótesis removible y comparar su calidad de vida asociada con la salud oral en pacientes dentados. La muestra estuvo compuesta por 148 pacientes dividido en tres grupos: primer grupo (edéntulos del arco maxilar) 68 pacientes, segundo grupo (completamente edéntulos) 50 pacientes, tercer grupo (grupo control dentados) 30 pacientes. Se recolectaron los datos mediante el cuestionario OHIP-EDENT, en cuatro oportunidades, la primera fue pretratamiento y a los 3, 6, 9 y 12 meses

posterior al tratamiento. Los resultados fueron los siguientes, la calidad de vida asociada con la salud oral fue más elevada para los grupos edéntulos y fue menos para el grupo de control dentados. El tratamiento con prótesis mejoró considerablemente la calidad de vida en los edéntulos, manteniendo este efecto después de 3 meses hasta los 12 meses de utilizar la prótesis. Los investigadores concluyeron que la rehabilitación con prótesis removibles de una o ambas arcadas mejoró significativamente la calidad de vida asociada con la salud oral del paciente edéntulo.

En el 2020, De Carvalho y col.¹⁴ realizaron una investigación con el fin de identificar el efecto del tratamiento rehabilitador en la calidad de vida y satisfacción de los sujetos desdentados. Mediante los cuestionarios: GOHAI y el OHIP-EDENT, se recopiló los datos de 80 pacientes. Como resultados se obtuvo que un 66,3% fueron mujeres, la prótesis parcial removible mandibular fue la más utilizada 53,8%, seguida de la prótesis parcial removible maxilar 52,5%, prótesis total maxilar 41,3% y prótesis total mandibular 52,5%. Las prótesis removibles que necesitaron recibir un ajuste fueron de 36,3%, dos ajustes 26,3%, tres ajustes 6,3%, cuatro ajustes o más 7,5%, ningún ajuste 23,8%. Los períodos promedio y mediana de utilización de la prótesis fueron de 201 ± 226 y 92 días. Pacientes que emplearon la prótesis por menos de 90 días 60,0% y pacientes que emplearon la prótesis por más de 90 días 40,0%. Ambos cuestionarios mostraron una correlación positiva. Todos informaron una mejoraría estética después de emplear la prótesis y una satisfacción

razonable con la prótesis creada. Los investigadores concluyeron que la calidad de vida mejoró en los pacientes con el uso de prótesis dentales.

En el 2019, González y col.¹⁵ llevaron a cabo un estudio para analizar la satisfacción de las personas de edad avanzada con el uso de prótesis completa en un Hospital de Zaruma. La muestra del estudio fue compuesta por 90 pacientes, se recopilaron los datos por medio del cuestionario GOHAI. Los resultados determinaron que un 60% fueron del género femenino. La dimensión dolor o incomodidad asociada al estado bucodental los partícipes mostraron molestias mínimas, la dimensión psicosocial la mayor parte de partícipes estaban satisfechos con su prótesis completa y en la dimensión física los partícipes mostraron dificultades para masticar restringiéndose en el tipo o cantidad de alimentos que ingerían. Aquellos que se sometieron a rehabilitación lograron una calidad de vida de moderada a alta con respecto a la salud bucodental. Los autores concluyeron que las personas mayores mediante el uso de prótesis removibles mostraron una mejor función en el sistema estomatognático y en su salud general, debido a que observaron mejoras en la autoestima y calidad de vida.

En el 2019, Pérez y col.¹⁶ llevaron a cabo una investigación para valorar la variación en la calidad de vida vinculada con la salud bucal en sujetos tratados en una Universidad de Bucaramanga. Se empleó la encuesta OHIP en dos oportunidades, la primera cita y diez meses posterior al tratamiento

rehabilitador en 37 pacientes. Como resultados se obtuvo que un 62,1% fueron mujeres. No hubo diferencias de género en la puntuación OHIP; obtuvieron prótesis superior e inferior 30 pacientes, obtuvieron una sola prótesis 7 pacientes, 46% fueron prótesis total y 13% prótesis parcial, 46,6% ambas prótesis totales, 13,3% ambas prótesis parciales y 40% prótesis total superior y parcial inferior. Se halló una diferencia significativa en la puntuación OHIP pretratamiento en comparación con el resultado de 10 meses postratamiento. Al comparar los grupos, se observaron resultados favorables en la puntuación OHIP en pacientes con ambas prótesis totales en comparación con aquellos con prótesis removible inferior y prótesis total superior, sin embargo, no hubo diferencias con otros tratamientos. Se concluye que la salud bucal de los pacientes mejoró significativamente y tuvo un efecto positivo en su calidad de vida.

En el 2019, Shrestha y col.¹⁷ desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo examinar las asociaciones entre el género y la edad en pacientes edéntulos para evaluar si las prótesis completas mejoran la calidad de vida vinculada con la salud oral. Se ejecutó mediante el cuestionario OHIP-EDENT-N, en dos oportunidades, la primera visita y 8 semanas luego del tratamiento en 100 pacientes edéntulos totales, entre 53 a 91 años. Los resultados fueron los siguientes, se observaron mejoras significativas en la mayoría de las áreas a excepción de la discapacidad social y el dolor físico. La edad y el género tuvieron mínima relación con la calidad de vida vinculada con la salud oral.

Los autores llegaron a la conclusión que una prótesis removible completa mejora la calidad de vida de las personas edéntulas en vinculación con la salud oral.

En el 2019, Valencia.¹⁸ realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar el efecto de las prótesis removibles en la calidad de vida asociada con la salud bucal de pacientes tratados en una Facultad Odontológica de Lima, la muestra fue de 217 pacientes rehabilitados en los años 2016, 2017 y 2018. Se recolectó mediante el cuestionario GOHAI, también se evaluó las variables de género, edad, percepción de la estabilidad, tiempo de uso, retención y tipo de prótesis removible. Los resultados fueron los siguientes: 52,44 de puntuación GOHAI lo cual representa un nivel moderado de autopercepción de la calidad de vida asociada con la salud bucal. La retención de las prótesis removibles y percepción de la estabilidad generó una asociación considerable con el cuestionario aplicado. El tipo de prótesis removible, género, edad y tiempo de uso no tuvieron una asociación significativa con el cuestionario aplicado. En conclusión, GOHAI es una herramienta confiable para medir la calidad de vida asociada a la salud bucal y la satisfacción con el tratamiento rehabilitador.

En el 2019, García.¹⁹ desarrolló una investigación, cuyo objetivo fue emplear el índice OHIP-49-mx para medir la calidad de vida de los pacientes del Hospital de Xochimilco que portaban prótesis parcial removible. Se ejecutó en 50 pacientes atendidos entre agosto y julio del 2019, aplicando el cuestionario

OHIP-49-mx. Los resultados fueron que un 70% mejoró positivamente su calidad de vida, 28% no experimentó cambios apreciables en su calidad de vida y el 2% experimentó una disminución. En conclusión, el tratamiento rehabilitador que recibieron se está realizando correctamente, ya que se evidencian cambios positivos en su calidad de vida.

En el 2018, Cuero.²⁰ realizó un estudio, con el objetivo de identificar el nivel de insatisfacción de los adultos mayores con la utilización de prótesis dentales en la zona del Valle de los Chillos. Se recopilaron los datos mediante los índices: OIDP y GOHAI, la muestra fue conformada por 42 pacientes. Como resultados se obtuvo que un 58% fueron del género femenino, entre los 65 a 98 años. En cuanto a su salud bucal y uso de prótesis dentales, solo el 48% de los partícipes se mostró satisfecho, mientras que el 52% expresó insatisfacción. El 42% de los hombres demostró una menor percepción del propio estado bucal. Según el índice OIDP, el 98% tuvo dificultad para comer y beber, el 69% tuvo dificultad con la higiene y el 67% tuvo dificultad para hablar y pronunciar. Como conclusión, el índice OIDP, presenta una alta correlación con la condición de la salud bucal de los partícipes, y el GOHAI difiere en las características específicas de los partícipes.

En el 2018, Vargas.²¹ desarrolló un estudio con el fin de analizar la salud oral y calidad de vida de pacientes tratados con prótesis dentales removibles atendidos en una posta médica en Lima. En una muestra de 75 pacientes se

administró el instrumento OHIP-14sp. Los resultados fueron los siguientes: el 42,7% de los encuestados respondió con frecuencia "sí" a la pregunta "¿Ha experimentado molestias dolorosas como resultado de problemas con su prótesis", y el 82,7% de los encuestados presentó un efecto en el estado de salud oral y calidad de vida. El ítem OHIP-14 que tuvo el mayor efecto en los encuestados fue el malestar psicológico. Como conclusión, encontramos que la calidad de vida y el estado de salud oral de los encuestados se vieron impactados por las prótesis parciales removibles, pero los factores sociodemográficos no influyeron en estos resultados.

En el 2018, Vargas K.²² desarrolló una investigación para establecer la vinculación entre la salud oral y calidad de vida en individuos con prótesis parcial removible. Se aplicó los cuestionarios: CPOD, IOHS, OHIP-EDENT y el índice de estado de la prótesis a 99 individuos adultos mayores. Los resultados fueron los siguientes, 87,9% eran mujeres, 12,1% eran hombres, 23,2% mostraron una calidad de vida buena y salud bucal regular, 37,4% de los individuos dispone de su prótesis entre 5 a 10 años, 31,3% lo tiene entre 2 a 5 años, 40,4% presentó un nivel regular del estado de salud bucal, 36,4% presentó un buen estado de salud bucal, 23,2% presentó una mala salud bucal, 42,4% tenía riesgo de caries moderado, 19,2% tenía riesgo de caries bajo, 38,4% tenía riesgo de caries alto, 84,8% logró adaptarse a su prótesis removible, 26,3% conservó su prótesis en óptimas condiciones, 54,5% de los individuos percibe una calidad de vida buena. La conclusión de dicha

investigación muestra que la salud oral está asociada con la calidad de vida en individuos adultos mayores.

En el 2018, Kaushik y col.²³ elaboraron un estudio con el objetivo de analizar y comparar el efecto de la prótesis completa en la calidad de vida asociada con la salud oral evaluada en tres momentos diferentes del tratamiento. Se seleccionó una muestra de 100 pacientes, empleando el cuestionario GOHAI, en tres momentos, previo a la instalación de la prótesis, 6 y 12 meses post instalación de la prótesis. En los resultados se obtuvo que el 63% fueron hombres, 37% fueron mujeres. Las puntuaciones de GOHAI previo a la instalación en mujeres fue de $25,19 \pm 0,88$, en hombres fue de $25,02 \pm 1,34$; 12 meses post tratamiento en mujeres fue de $9,05 \pm 1,20$, en hombres fue de $8,84 \pm 1,26$. Las puntuaciones de GOHAI según los grupos de edad para ambos géneros previo a la instalación en < 60 años fue de $24,98 \pm 0,98$, en > 60 años fue de $28,16 \pm 1,34$; 12 meses post tratamiento en < 60 años fue de $8,82 \pm 1,28$, en > 60 años fue de $9,00 \pm 1,20$. No se evidenció una diferencia relevante en las puntuaciones de género y edad. En conclusión, la puntuación de cada ítem del GOHAI tuvo un aumento desde la instalación hasta 6 y 12 meses post instalación, lo que evidencia que la calidad de vida asociada con la salud oral mejoró significativamente luego de la instalación protésica.

En el 2017, Guamanquispe.²⁴ realizó una investigación con el fin de establecer la calidad de vida de los pacientes edéntulos parciales antes y posterior de la

rehabilitación en una Facultad de Odontología de Quito. Se desarrolló mediante el cuestionario OHIP-14 en dos oportunidades; el primero fue pretratamiento y el segundo fue un mes posterior al tratamiento protésico, en 74 pacientes edéntulos. En los resultados se encontraron niveles elevados en pacientes con edentulismo previo y en mujeres durante la administración inicial del cuestionario, presentando discapacidad y malestar psicológico. Se observaron elevados niveles en la región desdentada posterior, en los adultos mayores y en pacientes que utilizaron prótesis removibles durante la administración del segundo cuestionario. El investigador concluye que el tratamiento rehabilitador tiene un impacto significativo en la calidad de vida del edéntulo parcial.

En el 2017, Degrandi y col.²⁵ desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar si existe una mejora en la calidad de vida asociada con la salud bucal en pacientes edéntulos bimaxilares rehabilitados con prótesis totales en una Facultad Odontológica de Uruguay. Se empleó el instrumento OHIP-14 en 100 pacientes adultos. Los resultados mostraron que antes del tratamiento rehabilitador fue $9,42 \pm 7,79$, al alta $3,13 \pm 4,49$, después de tres meses del alta $2,13 \pm 3,32$. La comparación de la primera y la tercera medición resaltó la reducción entre la primera y la segunda medición. En conclusión, se demostró que hubo una mejora significativa entre las dos variables de estudio asociadas posterior al tratamiento rehabilitador.

En el 2017, Flores.²⁶ realizó una investigación, su objetivo era evaluar la satisfacción de los pacientes que recibieron prótesis dentales removibles en una Facultad Odontológica de Piura. Su muestra fue establecida por 59 pacientes rehabilitados en el año 2016. Mediante las encuestas: OHIP y McGill, se obtuvieron los siguientes resultados, 67,8% estuvo satisfecho con su prótesis total y parcial removible. El 61,29% presentó satisfacción con la prótesis total removible, el 75% presentó satisfacción con la prótesis parcial removible. El 6,45% presentó baja satisfacción con la prótesis total removible, el 17,86% presentó baja satisfacción con la prótesis parcial removible. El investigador concluyó que las expectativas y percepciones del paciente sobre el tratamiento deben evaluarse detenidamente al momento de realizar una rehabilitación protésica para saber identificarlas y tenerlas en cuenta.

En el 2016, Valverde y col.²⁷ llevaron a cabo una investigación para evaluar el nivel de satisfacción del sujeto después de recibir su prótesis dental removible en una Universidad de Costa Rica. La muestra fue compuesta por 152 pacientes. Se recopilaron los datos mediante los instrumentos: OHIP-49, OHIP-19 EDENT. Los resultados fueron los siguientes, la satisfacción general fue de 9,3 sobre una escala del 1 al 10, la satisfacción fue de 8,54 medida en factores específicos, la masticación y la utilización diaria de la prótesis sin dolor fueron las menos satisfactorias, la prótesis removibles inferiores con respecto a los factores de masticación y uso libre de dolor fueron las menos satisfactorias, existe una asociación altamente positiva a la masticación,

pacientes de edad superior a 56 años que no eran físicamente activos y consumían licor tenían más probabilidades de producir niveles más bajos de satisfacción. Los investigadores concluyeron que la satisfacción del paciente con la rehabilitación protésica estaba por encima del 85%.

En el 2016, Bonnet y col.²⁸ realizaron una investigación con el propósito de determinar el impacto de la salud bucal en la calidad de vida de los pacientes y la satisfacción relacionada con la utilización de prótesis removibles renovadas. Su muestra fueron 116 pacientes. Se recopilaron los datos mediante el instrumento GOHAI y McGill en 2 oportunidades, pre y post instalación de la prótesis removible. Los resultados fueron los siguientes, las puntuaciones de GOHAI en los pacientes con prótesis removibles renovadas fue de $40,6 \pm 10,3$, en los de control fue de $45 \pm 12,1$. La puntuación GOHAI del área funcional no tuvo cambios, los sujetos que nunca utilizaron prótesis removibles presentaron un incremento del área funcional en la puntuación GOHAI. Según los ítems de estética, eficiencia masticatoria y condición oral; los sujetos presentaron un incremento en su satisfacción luego de la renovación. Los investigadores concluyeron que la renovación de la prótesis dental mejoró moderadamente la calidad de vida vinculada con la salud bucal y la satisfacción asociada con las prótesis removibles.

3. HIPÓTESIS

3.1 HIPÓTESIS GENERAL

“Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú”.

4. VARIABLES

4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES

- Nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible: Es el resultado de cómo percibe el paciente el tratamiento recibido, en comparación con las expectativas que inicialmente tenía o pudo haber desarrollado a lo largo de las visitas.²⁶
- Nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible: Es una medida en la que se altera el estilo de vida debido a la enfermedad, sus secuelas, tratamientos y/o políticas de salud basadas en condicionantes físicos, psicológicos, sociales y de reducción de oportunidades.²
- Prótesis dental removible: Es un tratamiento que permite la rehabilitación de desdentados parciales o totales, con el propósito de sustituir piezas perdidas y estructuras adyacentes para restablecer la masticación, fonación y estética.⁶

- Género: Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde una perspectiva sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.²⁹
- Grupo etario: Grupo de personas que comparten edades similares.³⁰

4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

La operacionalización de variables se desarrolló en el (Anexo 1).

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

“Determinar la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú”.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.
2. Identificar el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.

3. Identificar el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas.
4. Identificar el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas.

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO

6.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Por el número de variables: **Analítico**, ya que se evaluó la relación existente entre las variables del estudio.
- Por el número de mediciones: **Transversal**, ya que se ejecutó y permitió conocer la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida de los pacientes rehabilitados en un período determinado de tiempo.
- Según la fuente de recolección de datos: **Prospectivo**, ya que se estableció la relación entre el nivel de satisfacción y la calidad de vida de los pacientes rehabilitados de manera futura con este estudio.
- Por la intervención: **Observacional**, ya que el factor de estudio evaluado se conoció naturalmente, por tal motivo, el investigador no alteró su exposición, limitándose en informar los sucesos observados.

6.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación fue relacional, ya que se buscó saber la relación entre dos o más variables, el investigador no tuvo injerencia en la evolución natural del evento.

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo constituida por 134 pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú durante el periodo comprendido entre el año 2020 al 2022 y la muestra estuvo conformada por 100 pacientes rehabilitados.

6.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL Y MUESTREO

“El cálculo de la muestra se ejecutó mediante la fórmula de estimación para una proporción de población conocida”. (Anexo 2)

La muestra se recopiló a través del muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con los criterios de selección.

6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Historias clínicas odontológicas de pacientes que fueron rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú durante el período comprendido entre los años 2020 al 2022.

- Pacientes que tenían una cuenta de correo electrónico, utilizaban WhatsApp o Messenger.
- Pacientes de ambos géneros mayores de edad.
- Pacientes mayores de edad que aceptaron firmar el consentimiento informado.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- “Historias clínicas odontológicas que se encontraron incompletas de pacientes que fueron rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú durante el período comprendido entre los años 2020 al 2022”.
- Pacientes que fueron rehabilitados con prótesis implanto-asistida en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.
- Pacientes que no contaron con un dispositivo electrónico.
- Pacientes que no contaron con servicio de internet.

6.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS

El proyecto fue presentado al “Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista” para ser evaluado y aprobado a través de la Constancia N°1731-2022-CIEI-UPSJB (Anexo 3). Luego, se solicitó el permiso de la Gerente General de la Clínica Mydent Dental Robles, para recopilar los datos y aplicar un cuestionario virtual (Anexo 4). Los pacientes participaron voluntariamente en la encuesta, por lo que aceptaron

y estuvieron de acuerdo con un consentimiento informado.

Todos los datos recolectados se conservaron de forma anónima, para lo cual se creó un código basado en las primeras letras del nombre y apellido de cada participante al inicio del cuestionario, para garantizar que la confidencialidad de los participantes estuviera siempre protegida. Posteriormente, los datos fueron guardados en una carpeta codificada a la que solo podía acceder la investigadora. Una vez concluido el estudio, todos los datos fueron descartados.

6.6 PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Luego de obtener la autorización correspondiente de las autoridades de la clínica odontológica privada, se realizó la recolección de datos a través de las historias clínicas de cada paciente atendido en el período 2020 al 2022; cabe mencionar que la clínica odontológica privada brindó atención durante la pandemia del COVID-19, en el cual cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Posteriormente se revisó cada historia dentro de las instalaciones de la clínica, se observó el diagnóstico y tratamiento realizado, seleccionando únicamente las historias clínicas que cumplían con los criterios de selección. Después de la recopilación de datos, cada paciente recibió una presentación adecuada de mi parte como investigadora y se le explicó el propósito del estudio. Después de haber aclarado las posibles

dudas de los pacientes y firmar el consentimiento informado (Anexo 5) se procedió a realizar las encuestas relacionadas con el estudio.

Los instrumentos empleados, estuvieron constituidos por una ficha de recolección de datos que incluía información sociodemográfica y dos cuestionarios validados (Anexo 6), diseñados por medio de Google Forms® y la administración se realizó de manera online el cual fue remitida por correo electrónico, WhatsApp y Messenger; también de manera presencial, donde se implementó “todas las medidas de bioseguridad necesarias para realizar la encuesta de forma anónima a aquellos pacientes que acudieron a sus controles programados y también a través de llamadas telefónicas”.

El primer cuestionario; GOHAI, consta de 12 ítems que evalúan tres dimensiones. Las preguntas 1 a 4 pertenecen a la “dimensión física”, las preguntas 6, 7, 9, 10 y 11 pertenecen a la “dimensión psicosocial”, y las preguntas 5, 8 y 12 pertenecen a la “dimensión dolor”. Cada respuesta obtenida se calificó en una escala tipo Likert con 5 niveles de respuesta: siempre (1), frecuentemente (2), a veces (3), rara vez (4), nunca (5). A excepción de los ítems 2 y 6 que tienen una valoración inversa. El resultado total del GOHAI se dará mediante la sumatoria de los 12 ítems, el rango varía entre 12 – 60 puntos. Los valores entre los 57 – 60 puntos se consideran alto, 51 – 56 puntos se consideran moderado, 50 – 12 puntos se consideran bajo.

El segundo cuestionario; OHIP-EDENT, consta de 19 ítems que evalúan siete dimensiones. Limitación funcional (3 ítems), dolor físico (4 ítems), malestar

psicológico (2 ítems), discapacidad física (3 ítems), discapacidad psicológica (2 ítems), discapacidad social (3 ítems), minusvalía (2 ítems). Cada respuesta obtenida se calificó en una escala tipo Likert con 5 niveles de respuesta: nunca (0), casi nunca (1), algunas veces (2), frecuentemente (3), siempre (4). El resultado total del OHIP.EDENT se dará mediante la sumatoria de los 19 ítems, el rango varía entre 0 – 76 puntos. Los valores entre 0 – 25 puntos se consideran alto, 26 – 45 puntos se consideran moderado, 46 – 76 puntos se consideran bajo.

Se resumieron las especificaciones de los instrumentos de esta investigación en una ficha técnica (Anexo 7) y fueron evaluadas con base en las opiniones de tres expertos (Anexo 8).

6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Todos los datos se compilaron en una base de datos en Microsoft Excel 2016 y se exportó la información al software estadístico *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versión 26.

“Para las variables cualitativas o categóricas, el desarrollo de frecuencias absolutas y relativas se realizó mediante estadística descriptiva a nivel univariado. Se procedió a correlacionar las variables del estudio para la estadística inferencial y prueba de hipótesis empleando la prueba estadística Chi cuadrado de Pearson”.

7. RESULTADOS

Análisis inferencial: Prueba de hipótesis

Hipótesis general

- H₀: “No existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú”.
- H_a: “Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú”.

Nivel de significancia: 5% = 0,05

Estadístico de prueba: Chi-cuadrado de Pearson.

Tabla 1. Relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	70,289 ^a	4	0,000
Razón de verosimilitud	77,098	1	0,000
Prueba exacta de Fisher	55,380		
Asociación lineal por lineal	2,899 ^b	1	,000
N de casos válidos	100		

	Valor	Error estándar asintótico ^a	T aproximada ^b
Ordinal por ordinal	Gamma	1,000	0,000
N de casos válidos		100	7,867

a. No se presupone la hipótesis nula. b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

Según la tabla 1, se puede apreciar que al realizar el contraste de hipótesis de relación entre satisfacción y calidad de vida se obtuvo el valor de Chi-cuadrado de 70,289 y un p-valor de 0,000 que es menor a 0,05. “Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú”.

Tabla 2. Nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	31	31,0
Moderado	65	65,0
Alto	4	4,0
Total	100	100,0

Fuente: según encuesta realizada

Según la tabla 2, se encontró que el nivel de satisfacción prevalente fue moderado 65 de 100 encuestados que equivale a una prevalencia de 65,0%, seguido de satisfacción bajo (31/100) 31,0% y con nivel de satisfacción alto (4/100) 4,0%.

Tabla 3. Nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	2	2,0
Moderado	22	22,0
Alto	76	76,0
Total	100	100,0

Fuente: según encuesta realizada

Según la tabla 3, se encontró que el nivel de calidad de vida prevalente fue alto 76 de 100 encuestados que equivale a una prevalencia de 76,0%, seguido de calidad de vida moderado (22/100) 22,0% y con nivel de calidad de vida bajo (2/100) 2,0%.

Tabla 4. Nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas.

Característica	Satisfacción	Baja		Moderada		Alta		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Grupo etario	30 a 44 años	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	100,0
	45 a 60 años	1	31,0	29	69,0	0	0,0	42	100,0
	Más de 60 años	1	31,6	35	61,4	4	7,0	57	100,0
Tipo de prótesis	Prótesis Parcial	1	30,0	42	70,0	0	0,0	60	100,0
	Prótesis Total	1	32,5	23	57,5	4	10,0	40	100,0
Género	Femenino	1	28,1	43	67,2	3	4,7	64	100,0
	Masculino	1	36,1	22	61,1	1	2,8	36	100,0
	Total	3	31,0	65	65,0	4	4,0	100	100,0

n : frecuencia absoluta, %: frecuencia porcentual

Fuente: según encuesta realizada

Según la tabla 4, se encontró presencia del nivel de satisfacción según las características sociodemográficas, prevaleciendo el nivel moderado en todos los grupos, destacando en el grupo etario el de 30 a 44 años con 100,0 % seguido del grupo de 45 a 60 años con 69,0 %; tipo de prótesis parcial con 70,0 % y de acuerdo con el género fue el femenino con 67,2 %.

Tabla 5. Nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas.

Característica	Calidad de vida	Baja		Moderada		Alta		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Grupo etario	30 a 44 años	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0
	45 a 60 años	0	0,0	11	26,2	31	73,8	42	100,0
	Más de 60 años	2	3,5	11	19,3	44	77,2	57	100,0
Tipo de prótesis	Prótesis Parcial	1	1,7	13	21,7	46	76,7	60	100,0
	Prótesis Total	1	2,5	9	22,5	30	75,0	40	100,0
Género	Femenino	0	0,0	13	20,3	51	79,7	64	100,0
	Masculino	2	5,6	9	25,0	25	69,4	36	100,0
	Total	2	2,0	22	22,0	76	76,0	100	100,0

n : frecuencia absoluta, %: frecuencia porcentual

Fuente: según encuesta realizada

Según la tabla 5, se encontró presencia del nivel de calidad de vida según las características sociodemográficas, prevaleciendo el nivel alto en todos los grupos, destacando en el grupo etario el de 30 a 44 años con 100,0 % seguido del grupo de más de 60 años con 77,2 %; tipo de prótesis parcial con 76,7 % y de acuerdo con el género fue el femenino con 79,7 %.

8. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú. Se empleó los cuestionarios validados GOHAI y OHIP-EDENT, aplicados en 100 pacientes durante el período comprendido entre los años 2020 al 2022. Ambos cuestionarios fueron empleados para evaluar la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes con el uso de las prótesis dentales removibles.

En relación con los resultados obtenidos del presente estudio demuestran que existe una relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú. Estos resultados son similares a lo encontrado por De Carvalho y col.¹⁴ quienes concluyeron que existe una correlación positiva entre el GOHAI que evaluó el nivel de satisfacción y el OHIP-EDENT que evaluó el nivel de calidad de vida.

Con respecto a la satisfacción, se obtuvo que el 65,0% presentó un nivel moderado, estos resultados son similares a lo encontrado por González y col.¹⁵ con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis totales removibles, ambos determinaron que los pacientes presentaron en la satisfacción un nivel moderado. Este hallazgo probablemente se deba al hecho de que, si bien las prótesis removibles sustituyen las piezas dentarias perdidas, nunca logran el mismo nivel de satisfacción que la dentición

natural. Sin embargo, no podemos decir que hubo similitud a lo encontrado por Cuero²⁰ quien concluye que el 52% presentó un nivel bajo de satisfacción, debido a que los participantes presentaron dificultades para comer, beber, higienizarse y hablar, siendo los principales obstáculos para tener una buena satisfacción protésica. Por otro lado, De Carvalho y col.¹⁴ encontraron un nivel alto de satisfacción siendo distinto a nuestro estudio donde se registró un nivel moderado.

En cuanto a la calidad de vida, se obtuvo que el 76,0% presentó un nivel alto, estos resultados son similares a lo encontrado por De Carvalho y col.¹⁴ quienes concluyen que el nivel de calidad de vida fue alto. Al igual que Shrestha y col.¹⁷ y Couto y col.¹³ con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis totales removibles, también Vargas K.²² con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis parciales removibles, concluyendo que los pacientes presentaron en la calidad de vida un nivel alto. Este resultado posiblemente se deba al hecho de que los pacientes mejoraron significativamente su calidad de vida durante los meses posteriores al tratamiento. Ya que con el paso de los meses superan el proceso de adaptación a la prótesis y recuperan la funcionalidad, la estética, la confianza y la autoestima. Sin embargo, no podemos decir que hubo similitud a lo encontrado por Ferre¹¹ quien obtuvo que el nivel de calidad de vida fue moderado, con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis totales removibles. De igual forma contrario al estudio de Bonnet y col.²⁸ quienes concluyen que el nivel de calidad de vida fue moderado, ya que

la mayoría de los pacientes renovaron sus prótesis removibles ya existentes, lo cual limitó los cambios en la calidad de vida.

Por otro lado, según las características sociodemográficas con respecto al nivel de satisfacción, el género femenino predominó con un 67,2%, el grupo etario de 30 a 44 años fue predominante con un nivel de satisfacción moderado con un 100,0%. Así mismo este estudio determinó que el tipo de prótesis más frecuente fue la prótesis parcial removible con un 70,0% resultado similar a lo encontrado por De Carvalho y col.¹⁴ quienes concluyen que el género femenino obtuvo niveles más altos que el masculino con un 66,3% y el tipo de prótesis más utilizado fue la prótesis parcial removible. Al igual que González y col.¹⁵ quienes concluyeron en su estudio, que el género femenino predominó con un 60,0%, con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis totales removibles, también Cuero²⁰ quien obtuvo que el género femenino predominó con un 58,0%.

Por otra parte, según las características sociodemográficas con respecto al nivel de calidad de vida, el género femenino predominó con un 79,7%, el grupo etario de 30 a 44 años fue predominante con un nivel de calidad de vida alto con un 100,0%. Así mismo este estudio determinó que el tipo de prótesis más frecuente fue la prótesis parcial removible con un 76,7% resultado similar a lo encontrado por Pérez y col.¹⁶ quienes concluyen que el género femenino predominó con un 62,1% con un nivel de calidad de vida alto, también Couto y col.¹³ quienes concluyen que el género femenino predominó con más del 60,0%, con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis

totales removibles. Al igual que Vargas K.²² quien concluye en su estudio que el género femenino predominó con un 87,9%, con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis parciales removibles. Estos hallazgos relacionados con el género probablemente se deban a que las mujeres son las que más se involucran y cuidan su salud bucal que los hombres debido a sus instintos de género, además de que son menos propensas a los malos hábitos que dañan a la cavidad oral y el deterioro de su prótesis, lo que se refleja en la creciente demanda de intervenciones dentales y en el resultado posterior a la rehabilitación protésica. Asimismo, no podemos decir que hubo similitud a lo encontrado por Shrestha y col.¹⁷ quienes concluyen que el género masculino obtuvo niveles más altos que el femenino, con la diferencia que fueron obtenidos únicamente por las prótesis totales removibles, este estudio presentó una limitación en el número de participantes mujeres, lo cual impidió establecer un vínculo más claro entre el género y la calidad de vida. Los resultados de acuerdo con el grupo etario probablemente se deban a que mientras menos edad tenga el paciente, mejor es la capacidad de adaptación y aceptación de la prótesis. Cuanta más edad tenga el paciente presentara mayores cambios degenerativos, alteración de la coordinación neuromuscular y la salivación. Los hallazgos de acuerdo con el tipo de prótesis pueden deberse al número de piezas dentarias, ya que al haber menos dientes limitan las opciones de tratamiento y los tratamientos de rehabilitación con prótesis completas no brindan la misma estabilidad y retención que las prótesis parciales.

Dentro de las limitaciones de este estudio fue en la recolección de datos ya que, al ser administrada mayormente de manera virtual por medio de correo electrónico, WhatsApp y Messenger se produjo un retraso en la participación y respuesta de los cuestionarios por parte de los participantes, por lo tanto, llevó más tiempo de lo requerido poder obtener la muestra para elaborar la base de datos para esta investigación. Otra de las limitaciones fueron que el estudio es de tipo transversal y nivel relacional, lo que imposibilita la recolección de datos en diferentes momentos del tiempo sin poder evaluar y analizar cómo evoluciona una o más variables. Se encontró pocos estudios nacionales relacionadas con las variables de nivel de satisfacción y calidad de vida en prótesis dentales removibles, pese a ello, estas limitaciones no perjudicaron el desarrollo de esta investigación.

La importancia de este estudio consiste en conocer el nivel de satisfacción y la calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible, el cual permitirá al odontólogo implementar estrategias para identificar los factores que estén relacionados con una baja satisfacción y calidad de vida, permitiendo brindar un tratamiento odontológico óptimo.

Se recomienda realizar más estudios relacionados con el presente tema, que permita a los odontólogos evaluar las necesidades del paciente al momento de realizar el tratamiento de rehabilitación protésica.

9. CONCLUSIONES

- Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.
- El nivel de satisfacción que prevaleció en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible fue el nivel moderado.
- El nivel de calidad de vida que prevaleció en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible fue el nivel alto.
- El nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible según las características sociodemográficas según el grupo etario existe una tendencia que a mayor edad decrece la satisfacción, según el tipo de prótesis prevaleció la prótesis parcial removible y según el género prevaleció el género femenino.
- El nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible según las características sociodemográficas según el grupo etario existe una tendencia que a mayor edad decrece la calidad de vida, según el tipo de prótesis prevaleció la prótesis parcial removible y según el género prevaleció el género femenino.

10. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar más investigaciones similares con una mayor cantidad de población de estudio, con la finalidad de clarificar la relación existente entre satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados protésicamente.
- Se recomienda realizar investigaciones de tipo longitudinal, con controles periódicos con la finalidad de establecer un seguimiento de las variables de estudio durante el uso de la prótesis dental removible, así mismo incorporar otras variables como nivel socioeconómico, nivel educativo, experiencia protésica previa, presencia de controles protésicos y las dimensiones de los cuestionarios GOHAI y OHIP-EDENT, entre otros.
- Se recomienda en los establecimientos de salud públicos y privados que brinden atención odontológica fomenten la creación de un club de los pacientes que utilicen prótesis dental removible, con la finalidad de proveer acciones preventivas y promocionales sobre el cuidado de las prótesis en cada uno de los pacientes, incorporando a un profesional psicólogo para apoyar en la autoestima de estos.

11. BIBLIOGRAFÍA

1. Atarama M. Relación entre la frecuencia del edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy y el nivel de la satisfacción de los pacientes portadores de prótesis parciales removibles en la clínica odontológica de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016. [Internet] 2017. [Consultado 07 de junio 2022]. Disponible en: <http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5930>
2. Cazar E. Calidad de vida en pacientes de la Clínica de la Facultad de Odontología de la UCE, antes y después de ser rehabilitados con Prótesis Parcial Removible (basado en el perfil de impacto en la salud oral OHIP-14), Quito 2017. [Internet] 2017. [Consultado 07 de junio 2022]. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10937>
3. Reinoso M. Efectos psicológicos del edentulismo total y parcial y su nivel de satisfacción ante la rehabilitación protésica en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad de las Américas durante el periodo Septiembre 2015- Febrero 2016, Quito 2016. [Internet] 2016. [Consultado 07 de junio 2022]. Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2794527>
4. Contreras R. Impacto del edentulismo en la calidad de vida antes de una rehabilitación protésica en los pacientes que acuden a la Universidad Alas Peruanas, año 2018-I, Lima 2018. [Internet] 2018.

[Consultado 07 de junio 2022]. Disponible en:
<https://repositorio.uap.edu.pe/handle/20.500.12990/8300>

5. Kavita K, Iqbal Md, Singh R, Singh S, Nazeer J, Singh R. Factors affecting patient satisfaction among patients undergone removable prosthodontic rehabilitation. *Journal of Family Medicine and Primary Care*. 2020; 9(7):3544-3548. DOI: 10.4103/jfmprc.jfmprc_120_20
6. Meza M. Calidad de la función masticatoria y nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis removible parcial y total, Guayaquil 2020. [Internet] 2020. [Consultado 07 de junio 2022] Disponible en:
<http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/48518>
7. Colonia S. Nivel de satisfacción del paciente adulto rehabilitado con prótesis parcial removible y prótesis total en la clínica Integral I y II de la ULADECH Católica, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, año 2019, Chimbote 2022. [Internet] 2022. [Consultado 17 de agosto 2022]. Disponible en:
<https://hdl.handle.net/20.500.13032/28221>
8. Núñez J. Factores que afectan la satisfacción y continuidad del tratamiento protésico desde la perspectiva del paciente durante la pandemia covid-19, Lima 2021. [Internet] 2022. [Consultado 17 de agosto 2022]. Disponible en:
<http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/5024>
9. Suárez A. Evaluación de satisfacción de los pacientes portadores de prótesis removibles tratados en el centro de atención odontológica

- UDLA en el periodo 2015 y 2016, Quito 2017. [Internet] 2017. [Consultado 17 de agosto 2022]. Disponible en: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7281>
10. Ruiz N. Calidad de vida y salud oral en pacientes adultos mayores con rehabilitación protésica de la Clínica Continental Orthodontics, Lima, 2021. [Internet] 2022. [Consultado 07 de junio 2022]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/79717>
11. Ferre I. Calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis total removible atendidos en un centro especializado en formación odontológica, Chiclayo 2020. [Internet] 2022. [Consultado 29 de junio 2022]. Disponible en: <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/4523>
12. Oweis Y, Ereifej N, Al-Asmar Ayah, Nedal A. Factors affecting patient satisfaction with complete dentures. *International Journal of Dentistry*. 2022(3):1-7. DOI: 10.1155/2022/9565320
13. Couto A, Campos C, Salgueiro C, Damato L, Santos L, Alves A. Impact of new complete dentures on oral health-related quality of life: a 12-month follow-up. *The International Journal of Prosthodontics*. 2022;35(3):287-293. DOI: 10.11607/ijp.7645
14. De Carvalho B, Cavalcante R, Franco J, De Barros P. GOHAI and OHIP-EDENT Evaluation in removable dental prostheses users: Factorial analysis and influence of clinical and prosthetic variables. *Journal of Prosthodontics*. 2021(7):581-589. DOI: 10.1111/jopr.13304

15. González A, Veintimilla V, Villareal M. Nivel de satisfacción del uso de prótesis totales bimaxilares en adultos mayores del Hospital Dr. Humberto Molina de Zaruma entre abril del 2015 y enero del año 2016. Revista Científica de la Investigación y el conocimiento. 2019: 305-328. DOI: 10.26820/recimundo/3.(1).enero.2019.305-328
16. Pérez A, Pinto C. Calidad de vida de pacientes portadores de prótesis total y parcial removible atendidos durante primer semestre 2017 en la clínica integral del adulto III de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, Bucaramanga 2019. [Internet] 2019. [Consultado 07 de junio 2022] Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/17400>
17. Shrestha B, Basnet B, Adhikari G. A questionnaire study on the impact on oral health-related quality of life by conventional rehabilitation of edentulous patient. BDJ Open. 2020(6):3. DOI: 10.1038/s41405-020-0029-5
18. Valencia Y. Impacto de la rehabilitación protésica en la calidad de vida de los pacientes portadores de prótesis total y prótesis parcial removible atendidos en la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2019. [Internet] 2019. [Consultado 16 de agosto 2022]. Disponible: <https://hdl.handle.net/20.500.12672/10481>
19. García D. Evaluación de calidad de vida con el índice "OHIP" en pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible en el Hospital

- Militar El Vergel Iztapalapa, agosto 2018-julio 2019, Xochimilco 2019. [Internet] 2019. [Consultado 16 de agosto 2022]. Disponible: <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26050>
20. Cuero J. Valoración del índice de GOHAI y OIDP en pacientes de residencias para adultos mayores portadores de prótesis removibles, en el sector valle de los Chillos en un periodo de septiembre y octubre 2017, Quito 2018. [Internet] 2018. [Consultado 07 de junio 2022]. Disponible: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2791836>
21. Vargas A. Calidad de vida y condición de salud bucal en pacientes portadores de prótesis dentales removibles parciales que acuden al área de odontología en la Posta Médica Construcción Civil en el año 2017, Lima 2018. [Internet] 2018. [Consultado 08 de junio 2022]. Disponible: <https://repositorio.uap.edu.pe/handle/20.500.12990/6920>
22. Vargas K. Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018, Lima 2018. [Internet] 2019. [Consultado 16 de agosto 2022]. Disponible: <http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/2875>
23. Kaushik K, Dhawan P, Tandan P, Jain M. Oral health-related quality of life among patients after complete denture rehabilitation: a 12-month follow-up study. *Int J Appl Basic Med Res.* 2018;8(3):169-173. DOI: 10.4103/ijabmr.IJABMR_171_18

24. Guamanquispe V. Comparación de la calidad de vida de pacientes desdentados parciales, antes y después de un tratamiento, aplicando el OHIP-14, en la Clínica de la Facultad de Odontología de la UCE, Quito 2017. [Internet] 2017. [Consultado 29 de junio 2022]. Disponible: <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12760>
25. Degrandi V, Bentancourt M, Fabruccini A, Fuentes F. Evaluación del impacto en la calidad de vida de pacientes adultos rehabilitados con nuevas prótesis removibles totales. *Odontoestomatología*. 2017;19(49):64-75. DOI: <https://doi.org/10.22592/ode2017n29p64>.
26. Flores E. Nivel de satisfacción de pacientes rehabilitados con prótesis total y prótesis parcial removible en la clínica estomatología de la Universidad Cesar Vallejo Piura, 2017. Piura 2017. [Internet] 2017. [Consultado 07 de junio 2022]. Disponible: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/731>
27. Valverde A, Fernández O, Vargas T. Medición del éxito de los pacientes rehabilitados con prótesis removibles. *Odovtos-International Journal of Dental Sciences*. 2016; 18(2):61-72. DOI: <http://dx.doi.org/10.15517/ijds.v0i0.23920>
28. Bonnet G, Batisse C, Segyo J, Veyrone J, Nicolas E, Bessadet M. Influence of the renewal of removable dentures on oral health related quality of life. *Springerplus*. 2016;5(1):2019. DOI: 10.1186/s40064-016-3699-7

29. Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., versión 23.4 en línea. [consultado 16 de agosto del 2022].
Disponible en: <https://dle.rae.es/g%C3%A9nero?m=form>.
30. Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., versión 23.4 en línea. [consultado 01 de julio del 2022].
Disponible en: <https://dle.rae.es/etario?m=form>.

12. ANEXOS

ANEXO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DE VERIFICACIÓN	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADORES	TIPO	ESCALA	VALORES O ÍNDICES
Satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible	Es el resultado de cómo percibe el paciente el tratamiento recibido, en comparación con las expectativas que inicialmente tenía o pudo haber desarrollado a lo largo de las visitas. ²⁶	Satisfacción de pacientes rehabilitados con prótesis dental removible realizado por el odontólogo a través del cuestionario GOHAI, que está contenido por 3 indicadores.	<ul style="list-style-type: none"> • Función física • Función psicosocial • Dolor y incomodidad 	Cualitativo Politómica	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Alta satisfacción de 57 a 60 puntos • Moderada satisfacción de 51 a 56 puntos • Baja satisfacción de 50 a 12 puntos
Calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible	Es una medida en la que se altera el estilo de vida debido a la enfermedad, sus secuelas, tratamientos y/o políticas de salud basadas en condicionantes físicos, psicológicos, sociales y de reducción de oportunidades. ²	Calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible realizado por el odontólogo a través del cuestionario OHIP-EDENT, que está contenido por 7 indicadores.	<ul style="list-style-type: none"> • Limitación Funcional • Dolor Físico • Disconfort Psicológico • Incapacidad Física • Incapacidad Psicológica • Incapacidad Social • Minusvalía o Desventaja 	Cualitativo Politómica	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Alta calidad de vida de 0 a 25 puntos • Moderada calidad de vida de 26 a 45 puntos • Baja calidad de vida de 46 a 76 puntos.

COVARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADORES	TIPO	ESCALA	VALORES O ÍNDICES
Prótesis dental removible	Es un tratamiento que permite la rehabilitación de desdentados parciales o totales, con el propósito de sustituir piezas perdidas y estructuras adyacentes para restablecer la masticación, fonación y estética. ⁶	Tipo de aparatología protésica utilizada para rehabilitar la dentadura de un paciente	Registro de la encuesta	Cualitativo Dicotómica	Nominal	1. Prótesis parcial removible 2. Prótesis total removible
Género	Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde una perspectiva sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. ²⁹	Características que diferencian a hombres y mujeres en una sociedad	Registro de la encuesta	Cualitativo Dicotómica	Nominal	1. Masculino 2. Femenino
Grupo etario	Grupo de personas que comparten edades similares. ³⁰	Definida de acuerdo con el año de nacimiento.	Registro de la encuesta	Cuantitativo	Intervalo	1. menor a 30 años 2. 30 – 44 años 3. 45 – 60 años 4. 61 años a más

ANEXO 2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL

Se utilizó la siguiente formula:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

n: Tamaño de muestra

N: Total de la población de pacientes= 134

Z²: 1,96² (Confianza del 95%)

P: Proporción esperada (50% =0,5)

Q: 1 – p (1 - 0,5 = 0,5)

D : Precisión (5% = 0,05)

Reemplazando:

$$n = \frac{134 * 1,96^2 * 0,5 * 0,5}{0,05^2 * (134 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5}$$

$$n = 100$$

Por lo tanto, se encuestó a 100 pacientes rehabilitados con prótesis dental removible para el presente estudio.

ANEXO 3. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA.



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONSTANCIA N° 1731-2022-CIEI-UPSJB

El Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, deja constancia que el Proyecto de Investigación detallado a continuación fue **APROBADO** por el CIEI:

Código de Registro: **N° 1731-2022-CIEI-UPSJB**

Título del Proyecto: **“NIVEL DE SATISFACCION Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PROTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLINICA ODONTOLOGICA PRIVADA, LIMA-PERÚ”**

Investigador (a) Principal: **CASTRO ILLESCAS VERONICA SHEYLA**

El Comité Institucional de Ética en Investigación, considera que el proyecto de investigación cumple los lineamientos y estándares académicos, científicos y éticos de la UPSJB. De acuerdo a ello, el (la) investigador (a) se compromete a respetar las normas y principios de acuerdo al Código de Ética En Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social.

La aprobación tiene vigencia por un período efectivo de **un año** hasta el **14/11/2023**. De requerirse una renovación, el (la) investigador (a) principal realizará un nuevo proceso de revisión al CIEI al menos un mes previo a la fecha de expiración.

Como investigador (a) principal, es su deber contactar oportunamente al CIEI ante cualquier cambio al protocolo aprobado que podría ser considerado en una enmienda al presente proyecto.

Finalmente, el (la) investigador (a) debe responder a las solicitudes de seguimiento al proyecto que el CIEI pueda solicitar y deberá informar al CIEI sobre la culminación del estudio de acuerdo a los reglamentos establecidos.

Lima, 14 de noviembre de 2022.




Mg. Juan Antonio Flores Tumba
Presidente del Comité Institucional
de Ética en Investigación

www.upsjb.edu.pe

CHORRILLOS
Av. José Antonio Lavalle N°
302-304 (Ex Hacienda Villa)

SAN BORJA
Av. San Luis 1923 – 1925 – 1931

ICA
Carretera Panamericana Sur
Ex km 300 La Angostura,
Subtanjalla

CHINCHA
Calle Albilla 108 Urbanización
Las Viñas (Ex Toche)

CENTRAL TELEFÓNICA: (01) 748 2888

ANEXO 4. DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE LA INSTITUCIÓN.



Lima, 18 de noviembre del 2022

Señora Mg:

GORETTY DEL FATIMA GARCIA LUNA

Directora de la Escuela Profesional de Estomatología

Presente.-

De nuestra especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, por medio de la presente damos la autorización a la bachiller **Veronica Sheyla Castro Illescas** para dar las facilidades en la recolección de datos en la Clínica Mydent Dental Robles con el trabajo de investigación “**Nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima – Perú.**”

Sin otro particular me despido de usted

Atentamente.

C.D ESP. EDITH ROBLES RIVAS

Gerente General

Clínica Mydent Dental Robles

ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO

NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ.

PROPÓSITO

El propósito de este estudio es determinar el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú.

La participación en este estudio es VOLUNTARIA, si usted acepta participar, deberá aceptar este consentimiento informado.

Usted puede dejar de contestar algunas preguntas si así lo desea sin perjuicio de su participación en cuanto a los beneficios potenciales del estudio.

PROCEDIMIENTOS

El estudio está diseñado para ser usado una sola vez. No volveremos a realizar las mismas preguntas en otra ocasión, pero puedes contactarte con nosotros ante cualquier duda durante o después de participar. El cuestionario que te presentamos cuenta con un total de 31 preguntas en formato (WEB) que tomará un tiempo estimado de 20 minutos. Nuestro cuestionario considera preguntas de índole sociodemográficas y preguntas sobre el instrumento del estudio que deberá responder.

RIESGOS Y BENEFICIOS POTENCIALES

No existe riesgo alguno al participar en este estudio ya que solo recabaremos información sobre el género, grupo etario, tipo de prótesis removible, además del nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible. Se le requerirá colocar al inicio del cuestionario un código de participante que corresponderá a sus iniciales de nombres y apellidos para poder ligar los resultados del cuestionario a este código. Todos los datos del cuestionario que usted responda se mantendrán en forma

anónima, por lo que pueden ser usadas sin identificadores algunos con fines de generar conocimiento y ser publicados en revistas científicas para beneficio de la comunidad. Además, la base de datos será encriptada para poder tener mayor control de la información, sólo el investigador del estudio tendrá acceso a la contraseña de apertura de la base de datos.

COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN

“No habrá compensación económica por su participación del estudio. Sin embargo, pondremos a tu disposición los resultados del instrumento que lograste responder en el cuestionario de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible”.

Correo electrónico: _____

CONTACTO CON LOS INVESTIGADORES

Si requiere alguna consulta sobre su participación en el estudio puede contactarse al e-mail veronicas.castro@upsjb.edu.pe del investigador principal, Bachiller en Estomatología Verónica Sheyla Castro Illescas y el asesor Dr. Mg. Esp. Hernán Rafael Cachay Criado. Asimismo, para mayores informes usted podría comunicarse con el Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Privada San Juan Bautista al correo ciei@upsjb.edu.pe o al teléfono (01) 2142500 anexo 147.

Con todo lo anteriormente mencionado **¿Estás de acuerdo en brindarnos un consentimiento informado y participar de este estudio?**

<input type="checkbox"/>	Doy mi consentimiento
<input type="checkbox"/>	No doy mi consentimiento

ANEXO 6. INSTRUMENTO. ANEXO 6a. CUESTIONARIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ.

Escribe las letras iniciales de tus nombres y apellidos: _____

Instrucciones:

Lea atenta y detenidamente cada una de las preguntas del presente cuestionario.

Marque la(s) alternativa(s) que mejor exprese su situación.

A) DATOS GENERALES. -

Factores sociodemográficos:

- **Género:** Femenino () Masculino ()
- **Grupo Etario:**
 - a) Menor a 30 años
 - b) 30 – 44 años
 - c) 45 – 60 años
 - d) 61 años a más
- **Tipo de prótesis dental removible:**
 - a) Prótesis parcial removible
 - b) Prótesis total removible

PREGUNTAS SOBRE SATISFACCIÓN

1. ¿Limitó la clases o cantidad de alimentos debido a problemas con sus dientes o prótesis dentales?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

2. ¿Pudo comer cómodamente?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

3. ¿Sus dientes o prótesis le impidieron hablar del modo que usted quería?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

4. ¿Pudo comer lo que usted quería sin molestias de sus dientes o prótesis dentales?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces

d) Frecuentemente

e) Siempre

5. ¿Evitó estar en contacto con personas debido a la condición de sus dientes o prótesis dentales?

a) Nunca

b) Rara vez

c) A veces

d) Frecuentemente

e) Siempre

6. ¿ Se sintió satisfecho con la apariencia de sus dientes, encías o prótesis dentales?

a) Nunca

b) Rara vez

c) A veces

d) Frecuentemente

e) Siempre

7. ¿Se preocupó o intranquilizó por problemas con sus dientes, encías o prótesis dentales?

a) Nunca

b) Rara vez

c) A veces

d) Frecuentemente

e) Siempre

8. ¿Se sintió nervioso o consciente debido a problemas con sus dientes, encías o prótesis dentales?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

9. ¿Se sintió incomodo al comer frente a otras personas debido a problemas con sus dientes, encías o prótesis dentales?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

10. ¿Evito reír o sonreír debido a que sus dientes en la prótesis dental eran antiestéticos?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

11. ¿Ha tenido dolor o molestias alrededor de la boca?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

12. ¿ Sintió sus dientes o encías sensibles a los alimentos calientes, fríos o dulces?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) A veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

ANEXO 6b. INSTRUMENTO. CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ.

1. ¿Ha tenido dificultades mordiendo algún alimento por problemas con sus dientes, boca o prótesis?
 - a) Nunca
 - b) Casi nunca
 - c) Algunas veces
 - d) Frecuentemente
 - e) Siempre

2. ¿Ha retenido alimento en sus dientes o prótesis?
 - a) Nunca
 - b) Casi nunca
 - c) Algunas veces
 - d) Frecuentemente
 - e) Siempre

3. ¿Ha sentido que sus prótesis no ajustan apropiadamente?
 - a) Nunca
 - b) Casi nunca
 - c) Algunas veces
 - d) Frecuentemente
 - e) Siempre

4. ¿Ha tenido molestias dolorosas en su boca?
 - a) Nunca
 - b) Casi nunca
 - c) Algunas veces

- d) Frecuentemente
- e) Siempre

5. ¿Ha encontrado inconfortable comer algún alimento por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

6. ¿Ha tenido áreas dolorosas en su boca?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

7. ¿Ha tenido prótesis inconfortables?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

8. ¿Ha estado preocupado por problemas dentales?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

9. ¿ Ha sido consciente de si mismo por sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

10. ¿ Ha tenido que evitar comer algunos alimentos por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

11. ¿ Ha sido incapaz de comer con sus prótesis por problemas con ellas?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

12. ¿Ha tenido que interrumpir comidas por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

13. ¿Se ha sentido deprimido por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

14. ¿Ha estado un poco avergonzado por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

15. ¿Ha evitado salir por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

16. ¿Ha sido menos tolerante con su pareja o familia por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

17. ¿Ha estado un poco irritable con otra gente por problemas en sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

18. ¿Ha sido incapaz de disfrutar mucho la compañía de otra gente por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

19. ¿Ha sentido que la vida en general fue menos satisfactoria por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

- a) Nunca
- b) Casi nunca
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre

ANEXO 7. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO	
Nombre:	Cuestionario sobre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible.
Lugar de aplicación:	Lima - Perú
Forma aplicación:	Individual
Duración:	15 min
Número total de ítems:	31
Variables:	Nivel de satisfacción, nivel de calidad de vida
Año:	2022
1. NIVEL DE SATISFACCION EN PACIENTES REHABILITADOS CON PROTESIS DENTAL REMOVIBLE	
Número de ítems:	12
Autor:	Atchinson y Dolan (1990) ¹⁵
Número de dimensiones:	03
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Función física (4 ítems) 2. Función psicosocial (5 ítems) 3. Dolor/incomodidad (3 ítems)
Confiabilidad:	Alfa de Cronbach 0.89
Validez:	Validado con el Criterio de Juicio de Expertos (V de Aiken = 0,90)
2. “NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PROTESIS DENTAL REMOVIBLE”	
Número de ítems:	19
Autor:	Locker y Allen (2002) ¹
Número de dimensiones:	07
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limitación funcional (3 ítems) 2. Dolor físico (4 ítems) 3. Disconfort psicológico (2 ítems) 4. Incapacidad física (3 ítems) 5. Incapacidad psicológica (2 ítems) 6. Incapacidad social (3 ítems) 7. Desventaja (2 ítems)
Confiabilidad:	Alfa de Cronbach 0.90
Validez:	Validado con el Criterio de Juicio de Expertos (V de Aiken = 0,90)
Opinion de experto:	<ul style="list-style-type: none"> - Mg. CD. Chilón Minaya Lesly Johanna - CD. Esp. Machuca Reyes Víctor Orlando - CD. Esp. Chuqui huaccha Porrás José Alberto

ANEXO 8. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

I.1 Apellidos y Nombres del Informante: Chilón Minaya Lesly Johanna

I.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Privada San Juan Bautista

I.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú.

I.5 Autor (a) del instrumento: Extraído de (Kathryn A. Atchison, y Teresa A. Dolan)¹⁵ y validado en la UPSJB por **(Verónica Sheyla Castro Illescas)**.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00 – 20%	Regular 21 – 40%	Buena 41- 60%	Muy Buena 61 – 80%	Excelente 81 – 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances la teoría sobre el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X

ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y en cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X
CONSISTENCIA	Basados en los aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación determinar el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X

.....
.....
.....
.....

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

Aplicable (**X**)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

90%

Lugar y Fecha: Lima 23 de Septiembre de 2022



Firma del Experto informante

DNI N°40505773

Teléfono: 991202250

ANEXO 8b. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

I.1 Apellidos y Nombres del Informante: Chilón Minaya Lesly Johanna

I.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Privada San Juan Bautista

I.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú.

I.5 Autor (a) del instrumento: Extraído de (Locker y Allen)¹ y validado en la UPSJB por **(Veronica Sheyla Castro Illescas)**.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00 – 20%	Regular 21 – 40%	Buena 41- 60%	Muy Buena 61 – 80%	Excelente 81 – 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances la teoría sobre el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.					X

ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y en cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.					X
CONSISTENCIA	Basados en los aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación determinar el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica					X

	odontológica privada.					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

.....

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

Aplicable (**X**)
 Aplicable después de corregir ()
 No aplicable ()

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

90%

Lugar y Fecha: Lima 23 de Setiembre de 2022



Firma del Experto informante

DNI N°40505773

Teléfono: 991202250

ANEXO 8c. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

I.1 Apellidos y Nombres del Informante: Machuca Reyes Victor Orlando

I.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Privada San Juan Bautista

I.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú.

I.5 Autor (a) del instrumento: Extraído de (Kathryn A. Atchison, y Teresa A. Dolan)¹⁵ y validado en la UPSJB por (**Verónica Sheyla Castro Illescas**).

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

X	CRITERIOS	Deficiente 00 – 20%	Regular 21 – 40%	Buena 41- 60%	Muy Buena 61 – 80%	Excelente 81 – 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances la teoría sobre el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X
ORGANIZACIÓN	Existe una organización					

	lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y en cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X
CONSISTENCIA	Basados en los aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación determinar el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X

.....
.....
.....
.....

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

Aplicable ()


Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

92 %

Lugar y Fecha: Lima 26 de Setiembre de 2022



Firma del Experto informante

DNI N°09478588

Teléfono:989001515

ANEXO 8d. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

- I.1 Apellidos y Nombres del Informante: Machuca Reyes Victor Orlando
 I.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Privada San Juan Bautista
 I.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico
 I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú.
 I.5 Autor (a) del instrumento: Extraído de (Locker y Allen)¹ y validado en la UPSJB por **(Veronica Sheyla Castro Illescas)**.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00 – 20%	Regular 21 – 40%	Buena 41- 60%	Muy Buena 61 – 80%	Excelente 81 – 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances la teoría sobre el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.					X

ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y en cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.				X	
CONSISTENCIA	Basados en los aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación determinar el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica					X

	odontológica privada.					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

.....
.....
.....
.....

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

Aplicable (**X**)
Aplicable después de corregir ()
No aplicable ()

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

90%

Lugar y Fecha: Lima 26 de Setiembre de 2022



Firma del Experto informante

DNI N°09478588

Teléfono: 989001515

ANEXO 8e. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

I.1 Apellidos y Nombres del Informante: Chuqui huaccha Porras José Alberto

I.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Privada San Juan Bautista

I.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú.

I.5 Autor (a) del instrumento: Extraído de (Kathryn A. Atchison, y Teresa A. Dolan)¹⁵ y validado en la UPSJB por (Verónica Sheyla Castro Illescas).

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00 – 20%	Regular 21 – 40%	Buena 41- 60%	Muy Buena 61 – 80%	Excelente 81 – 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances la teoría sobre el nivel de satisfacción					X

Chuqui huaccha

	en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y en cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					X
CONSISTENCIA	Basados en los aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación determinar el nivel de satisfacción en pacientes					X

J. Acuña

	rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada					
--	---	--	--	--	--	--

Cumple con los criterios correspondientes al estudio planteado concordante con lo planteado en el cuestionario.

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

Aplicable (X)


Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

90%

Lugar y Fecha: Lima 24 de setiembre del 2022


 José Alberto ChuquiHuaccha Porras
 DNI N° 21485407
 Teléfono: 999745275
 COP 6794 NRE 418

ANEXO 8f. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

I.1 Apellidos y Nombres del Informante: Chuqui huaccha Porras José Alberto

I.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Privada San Juan Bautista

I.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú.

I.5 Autor (a) del instrumento: Extraído de (Locker y Allen)¹ y validado en la UPSJB por (Veronica Sheyla Castro Illescas).

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00 – 20%	Regular 21 – 40%	Buena 41- 60%	Muy Buen a 61 – 80%	Excelente 81 – 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances la teoría sobre el nivel de calidad de					X

J. Chuqui huaccha

	vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.					
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y en cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.					X
CONSISTENCIA	Basados en los aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación determinar el nivel de					X

J. P. Sánchez

	calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada.					
--	---	--	--	--	--	--

.....
cumple con los criterios correspondientes al estudio planteado concuerda con el cuestionario

III. **OPINIÓN DE APLICABILIDAD** (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

Aplicable ()

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

IV. **PROMEDIO DE VALORACIÓN**

90 %

Lima, 30 de setiembre del 2022



José Alberto Chuqui huaccha Porras
 DNI N° 21485407
 Teléfono: 999745275
 COP 6794 NRE 418

ANEXO 9. MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVO	VARIABLE	
	GENERAL	GENERAL	INDICADOR	NIVEL DE MEDICIÓN
"NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRIVADA, LIMA – PERÚ".	¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada, Lima-Perú?	"Determinar la relación entre el nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú".	Cuestionario del nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible	<ul style="list-style-type: none"> - Alto (57-60 puntos) - Moderado (51-56 puntos) - Bajo (50-12 puntos)
	ESPECÍFICOS	ESPECÍFICOS		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú? 2. ¿Cuál es el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú? 3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú. 2. Identificar el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú. 3. Identificar el nivel de satisfacción en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características 	<p>Cuestionario del nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible</p> <p>Tipo de prótesis dental removible</p> <p>Género</p> <p>Grupo etario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alto (0 - 25 puntos) - Moderado (26 – 45 puntos) - Bajo (46 - 76 puntos) - Prótesis parcial removible - Prótesis total removible - Masculino - Femenino - Menor a 30 años - 30 – 44 años - 45 – 60 años - 61 años a más

	4. ¿Cuál es el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas?	sociodemográficas. 4. Identificar el nivel de calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible en una clínica odontológica privada de Lima-Perú, según las características sociodemográficas.		
DISEÑO, TIPO Y NIVEL		POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ANÁLISIS ESTADÍSTICO
<p>Diseño: no experimental Tipo: analítico, transversal, prospectivo y observacional Nivel: relacional</p>		<p>N= 134 pacientes n= 100 pacientes</p>	<p>Los instrumentos utilizados fueron 2 cuestionarios del nivel de satisfacción y calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible</p>	<p>Análisis univariado: frecuencias y porcentajes. Análisis bivariado: Chi cuadrado de Pearson</p>