


**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS AL ABORTO INCOMPLETO
EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL LAURA
ESTER RODRIGUEZ DULANTO, LIMA-PERÚ, DE
ENERO – JUNIO DEL 2016.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ENZO ROBERTO CABRERA RAMIREZ

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: El siguiente estudio de investigación que se realizó fue con la finalidad de identificar los factores que se asocian al aborto incompleto en pacientes del área de gineco-obstetricia del hospital Laura Ester Rodriguez Dulanto -Hospital de supe- Lima-Perú desde enero – junio del 2016.

Materiales y métodos: El siguiente estudio fue tipo descriptivo, retrospectivo, el estudio tuvo un total 27 historias clínicas con diagnóstico de aborto incompleto. Los datos se obtuvieron de historias clínicas, para analizar los resultados se empleó el SPSS 23.

Resultados: El factor que más se asoció al aborto incompleto fue el antecedente de aborto previo con un 59,3%, seguido de traumatismos con un 40,7%, el tipo de aborto incompleto precoz tuvo una mayor frecuencia con un 77,2%, se determinó que el aborto incompleto se manifestó la mayoría pacientes de 19 años con 4 casos, el 59,3% tuvo antecedente de abortos previos, mientras que un 40,7% presentó aborto incompleto precedido de algún traumatismo.

Conclusiones: Se concluye que el antecedente de aborto previo constituyó el factor más asociado, el aborto incompleto precoz fue el más frecuente, siendo la edad de 19 años la que presento mayor recurrencia de casos y la causa desencadenante fue precedida por algún traumatismo.

Palabras claves: Factores asociados, aborto incompleto.