

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**INDICADORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD EN
PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
PRIMARIA ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA EL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN EL
PERIODO 2014 - 2016.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
YSABEL ROSA ESPERANZA TRANCON MADRID**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2017**

RESUMEN

Objetivos: El objetivo de presente estudio es determinar los indicadores predictivos de mortalidad en pacientes con Hemorragia Subaracnoidea primaria atendidos en la emergencia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en el periodo 2014 – 2016.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, comparativo, retrospectivo, transversal. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico Hemorragia Subaracnoidea del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz durante el periodo ya mencionado. La recolección de datos se realizó manualmente mediante la ficha de recolección de datos, esta información se obtuvo revisando las historias clínicas en el archivo de dicho hospital, con el debido permiso. La información se procesó mediante el programa SPSS versión 22.

Resultados: En los resultados se obtuvo que la edad media fue $62,2 \pm 17,6$ años, donde la hipercloremia y la hiperglicemia presentaron diferencia significativa entre los pacientes que fallecieron y sobrevivieron. En los predictores clínicos, se observó que la hipertensión arterial, el grado IV-V de la Escala de Hunt y Hess y el tratamiento médico son factores de riesgo para mortalidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea primaria; los pacientes que fallecieron presentaron mayor frecuencia de hipertensión arterial (83,3%), grado IV-V escala Hunt y Hess (83,3%) y tratamiento médico (33,3%) respecto a los que sobrevivieron. Se determinó que el tratamiento médico y el grado IV-V de la Escala Hunt y Hess son variables predictoras de mortalidad.

Conclusiones: En el estudio se concluyó que los indicadores predictivos multivariantes de la mortalidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea primaria son: el grado IV-V de la Escala Hunt y Hess y tratamiento médico.

Palabras claves: predictores, mortalidad, hemorragia subaracnoidea primaria.