

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERISTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLOGICAS DE
HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA EN EL
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL
NACIONAL HIPÓLITO UNANUE EN EL 2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

TICONA VILLANUEVA JOSELYN BRENDA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

La hemorragia post parto está entre las causas más comunes de muerte materna en países sub desarrollados y en países desarrollados, representando en el 2015 un 24% motivo por el cual es de interés el estudio de este problema de salud pública.

El presente estudio es de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo transversal, retrospectivo en el cual vamos a identificar las características clínico epidemiológicas de la hemorragia postparto inmediata en 210 pacientes atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del HNHU en el 2016.

La edad más frecuente que se encontró fue de 16 a 25 años con un 38,1%; multíparas un 25,2% y como factor de hemorragia post parto el tipo de parto vaginal un 54,3%, el tratamiento coadyuvante principal fue la oxitocina con un 42.4% y el tratamiento quirúrgico fue la sutura B- Lynch con un 32.4%.

Concluimos que las pacientes dentro del rango de edad de 16 a 25 años, multíparas y con parto vaginal son características clínicas de pacientes que presentaron hemorragia post parto inmediato.

PALABRAS CLAVES: Hemorragia post parto inmediato.