

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A
PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES DE 35-65
AÑOS HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL
POLICIA NACIONAL DEL PERU LUIS.N.SAENZ
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016, LIMA-PERÚ**

**TESIS PRESENTADO POR BACHILLER
ARELI VALDIVIA OPORTO**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
- 2017 -**

RESUMEN

La pancreatitis aguda es una inflamación súbita que dura poco tiempo. Puede variar desde una leve molestia hasta una enfermedad grave que amenaza la vida. La mayoría de las personas con pancreatitis aguda se recuperan completamente después de recibir el tratamiento adecuado, por lo que un correcto interrogatorio y examen físicos son de vital importancia. **Objetivo:** Determinar cuáles son los factores de riesgos asociados a pancreatitis aguda en pacientes de 35-65 años hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital Nacional Policia Nacional del Perú Luis N. Saenz, Periodo Enero - Diciembre 2016, Lima-Perú. **Material y Métodos:** Según tiempo de ocurrencia: retrospectivo, según período y secuencia: transversal, según análisis y alcance de los resultados: descriptivo, según la actitud del investigador: observacional, desarrollado en el HNPNP LNS. La población estuvo conformada por todos los pacientes hospitalizados sin distinción de sexo de 35-65 años en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Policia Nacional del Perú Luis N. Saenz Periodo Enero - Diciembre 2016, Lima-Perú. La muestra estuvo conformada 64 pacientes. En la recolección de datos, se identificó los mediante revisión de historias clínicas y se aplicó un cuestionario estructurado. En el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva mediante Programa estadístico SPSS v.22. **Resultados:** Se estudiaron 64 casos. En el cual el grupo etario y género más expuesto fueron las edades de 35-44años, sexo masculino (63%) respectivamente y los factores de riesgo que se encontraron, que contribuyeron al desarrollo de pancreatitis aguda, fueron: antecedente de litiasis vesicular (53%), alcoholismo (40%) e ingesta de comidas copiosas (20%). **Conclusiones:** En este trabajo se concluyó que el sexo predominante fue el masculino y que los factores de riesgo más implicados en el desarrollo de pancreatitis aguda fue la litiasis biliar previa, y en un menor rango fueron el alcoholismo y la ingesta de comidas copiosas