


UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**DEPRESIÓN EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO II EN EL SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO
UNANUE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A
JUNIO DEL 2016.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
TRISOLINI FLORES ONORVE**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2017**

RESUMEN

Esta investigación busca determinar la presencia de Depresión y cómo interviene ésta en pacientes con diabetes Mellitus tipo II.

Se trabajó con una muestra total de 135 pacientes entre las edades de 13 a 85 años, la información fue recogida a través de la encuesta de Beck que contiene 21 preguntas y 4 preguntas adicionales para analizar la Diabetes, los pacientes contestaron libremente las preguntas, la información recibida ha sido procesada por el programa estadístico SPSS en donde se podrá apreciar en la parte descriptiva: gráfico de barras, tablas para poder analizar los resultados.

Como resultados de la encuesta del Test de Beck se obtuvo lo siguiente: 1-10 Estados altibajos son considerados normales un 37.04%, 11-16 Leve perturbación del estado de ánimo un 44.44%, 17-20 Estados de depresión intermitentes un 7.41%, 21-30 Depresión moderada un 6.67, 31-40 Depresión grave 1.48% y +40 Depresión extrema un 2.96%.

Palabras claves: Depresión, paciente, Diabetes Mellitus tipo II, Test de Beck.