

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS
ASOCIADOS A LA CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS
DE 2 A 14 AÑOS EN EMERGENCIA DE
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO
BERNALES EN EL PERIODO ENERO 2015 –
DICIEMBRE 2015**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
MANUEL ALEJANDRO MENDOZA GARCIA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA- PERÚ
2017**

RESUMEN

La finalidad de este trabajo de investigación es describir los factores predisponentes de crisis de asma en pacientes de 2 años a 14 años del Hospital Nacional Sergio Bernales durante el año 2015. Para así describir qué tipo de crisis de asma más frecuente de acuerdo al sexo, edad, horario, procedencia y por mes.

Metodología: El estudio es un diseño de tipo observacional, descriptivo retrospectivo y transversal. Se revisaron, los registros de ingresos durante el año 2015, del Servicio de Emergencias pediátrica del HNSB. Siendo la población 30554 y la muestra 1312 niños con crisis de asma. Una vez obtenido los resultados fueron tabulados en el programa de Excel y procesado en el programa de SPSS 22.

En conclusión: los resultados obtenidos de 1312 niños de 2 a 14 años, fueron que el sexo más frecuente son los varones con un 62.9%. Siendo la edad con mayor número los 5 años con un 13.4%. Y el horario donde acuden al servicio es de 6 am a 12 am. El mes en la que acuden en mayor frecuencia fue en el mes de octubre con un 13%. El tipo de crisis más frecuente fue crisis de asma moderado con un 56.6%. El resultado de hipótesis fue que el género no es dependiente de crisis de asma.

Palabras clave: prevalencia, crisis de asma.