

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE
LESIÓN INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO, EN
MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL VITARTE
DURANTE EL PERIODO 2011-2015.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ROSA MAGALY CORTEZ ROJAS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de lesión intraepitelial de alto grado, en mujeres atendidas en el Hospital Vitarte durante el periodo 2011-2015.

METODOLOGÍA: Estudio de tipo analítico con diseño de casos y controles, retrospectivo, longitudinal. Grupo de casos formado por 190 mujeres con diagnóstico de lesión intraepitelial de alto grado; grupo control conformado por 734 mujeres del mismo entorno, con edades similares. Los datos obtenidos se presentaron en números absolutos y porcentajes. El instrumento fue el Formato de Programa de Control de Cáncer de Cuello Uterino, del Hospital Vitarte. Se utilizaron los programas Excel versión 2016 y SPSS versión 22.

RESULTADOS: La frecuencia según edad predominó para mujeres mayores de 20 años (65%), el grado de instrucción predominante fue secundaria (57%), el inicio de relaciones sexuales fue antes de los 18 años (41%) OR 2.50 ($p=0.004$), la paridad (85%) con 3 o más partos OR 5.75 ($p=0.000$), predominó el tener más de una pareja sexual (68%) OR 5.79 ($p<0.05$), el no uso de preservativo (71%)OR 8.40 ($p<0.05$), la presencia del VPH (59%)OR 9.32 ($p=0.004$), y el tener más de una ETS previa (80%)OR 9.32 ($p<0.05$).

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo que influyeron en el desarrollo de Lesión intraepitelial de alto grado, en las mujeres atendidas en el Hospital Vitarte fueron: el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, la multiparidad (haber tenido 3 o más partos), las conductas sexuales de riesgo: más de una pareja sexual y el no uso de preservativo, las infecciones de transmisión sexual: haber tenido o tener infección por Virus del Papiloma humano y antecedente de haber tenido más de una ETS previa.

PALABRAS CLAVES: Cáncer de cérvix, factores de riesgo, virus del papiloma, lesión intraepitelial de alto grado.