

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” DE CHOSICA, AÑO 2015.

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

FLORES CONDORI SILVIA NOEMI

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Determinar la hemorragia digestiva alta en el servicio de Medicina Interna del Hospital “José Agurto Tello” de Chosica, año 2015.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo, observacional y retrospectivo. La población estuvo constituida por 100 pacientes según criterios de inclusión y exclusión establecidos, seleccionando aquellos que presentaron por lo menos un episodio de hemorragia digestiva alta.

Resultados: La edad promedio de la población estudiada es de 63 años, de los cuales el 51% era del género masculino y el 49% pertenecían al género femenino. Se encontró dentro de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la hemorragia digestiva alta son el uso de AINES, el tabaquismo y el alcoholismo. Se evidencia además, mayor incidencia en pacientes con edad mayor a 60 años. Así mismo el género masculino es el más afectado por esta situación clínica.

Conclusiones: El uso de AINES asociado a comorbilidades en los pacientes, son factores que favorecen el desarrollo de hemorragia digestiva alta, al igual que la edad mayor a 60 años. La recurrencia esta principalmente asociado al grado de instrucción y el estrato socioeconómico. El uso continuo de cigarrillos y el consumo de alcohol son también factores de riesgo con mayor recurrencia en el desarrollo de la hemorragia digestiva alta.

Palabras clave: hemorragia digestiva alta.