

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO PERINATALES E ICTERICIA  
NEONATAL PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE  
VITARTE DURANTE EL AÑO 2015**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**REY JORGE ALFARO PEÑA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar la asociación existente entre los factores de riesgo perinatales y la ictericia neonatal patológica durante el año 2015.

**MATERIALES Y METODO:** Se llevó a cabo un estudio de tipo, observacional, analítico, retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo conformada por 160 pacientes con ictericia neonatal de los cuales se obtuvo una muestra no probabilística de 74 pacientes según criterios de inclusión y exclusión establecidos, en dos grupos: un grupo de 74 casos y 74 controles.

Se utilizó en el análisis estadístico para las variables cualitativas independientes y dependientes categórica por lo que se utilizó el Chi cuadrado. La significancia se midió según cada estadígrafo para  $p$  menor o igual a 0.05. **RESULTADOS:** El análisis estadístico sobre las variables en estudio como factores asociados a ictericia neonatal patológica que requirió uso de fototerapia fueron: Incompatibilidad ABO (OR: 7.28;  $p < 0.05$ ), Prematuridad (OR: 1.84;  $p > 0.05$ ), Bajo peso al nacer (OR: 1.31;  $p > 0.05$ ).

**CONCLUSIONES:** La incompatibilidad ABO es un factor asociado a la ictericia Neonatal Patológica, mientras que la prematuridad y el bajo peso al nacer no son factores asociados a ictericia neonatal patológica.

**PALABRAS CLAVES:** Ictericia Neonatal Patológica, Factores de Riesgo Perinatales.