

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES ASOCIADOS A RUPTURA PREMATURA DE
MEMBRANA EN PACIENTES GESTANTES QUE ACUDEN AL
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL
CARLOS LANFRANCO LA HOZ DURANTE EL PERIODO
ENERO - DICIEMBRE 2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

MARIA ELENA ROJAS RAMOS

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

La ruptura prematura de membrana se define como la rotura de las membranas ovulares después de las 21 semanas de edad gestacional y hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto²⁹. La investigación tiene por

objetivo: Determinar los factores asociados a ruptura prematura de membrana en pacientes gestantes que acuden al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016.

Materiales y Métodos: Es un estudio de tipo retrospectivo, transversal, descriptivo y Observacional. La muestra: Estuvo conformada por 108 pacientes con el diagnóstico de ruptura prematura de membrana se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos.

Resultados: La edad materna tuvo un mayor porcentaje alcanzando un 80.56% (87 pacientes) que corresponde a pacientes entre 18 a 34 años de edad, se evidencia que un 47.22% (51 pacientes) de las gestantes tienen secundaria completa. Entre los factores obstétricos se encontró que un 50.93% (55 pacientes) de las gestantes corresponde a nulíparas, además se evidencia que un 69.44% (77 pacientes) tienen un control prenatal inadecuado, la edad gestacional con un 88,9% (96 pacientes) que estuvieron más de 37 semanas. Respecto a los factores clínicos materno un 56.50% presenta ITU (61 pacientes) y un 64.81% (70pacientes) presentó anemia.

Conclusión: Entre los factores más relevantes de las pacientes con ruptura prematura de membranas fueron: la edad de 18 a 34 años, el grado de instrucción con secundaria completa, la nuliparidad, menor control prenatal, la edad gestacional mayor a 37 semanas, las infecciones del tracto urinario y la anemia.

Palabras Claves: Ruptura prematura de membranas, factores asociados