

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS
ASOCIADAS A LA TUBERCULOSIS EN PACIENTES
MAYORES DE 30 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD
VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO DURANTE
EL PERIODO 2010 AL 2015 LIMA – PERÚ**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
ABIGAIL SHINA LANDA CCAHUAY**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2017**

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas y clínicas asociadas a la tuberculosis en pacientes mayores de 30 años en el Centro de Salud Villa María del Perpetuo Socorro durante el periodo 2010 al 2015 Lima-Perú. **Metodología:** El tipo de estudio es descriptivo, observacional y de corte retrospectivo. La muestra estuvo constituida por 126 pacientes mayores de 30 años con diagnóstico de tuberculosis en el Centro de Salud en estudio. Para la recolección de datos se empleó una ficha de recolección de datos. El análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS 23, para la elaboración de tablas y gráficos, para su análisis correspondiente. **Resultados:** En relación de las características epidemiológicas, se obtuvo que el rango de edad más frecuente es de 30 a 39 años con un 36,6%, el sexo masculino representa el 61,1%, el mayor porcentaje son comerciantes con un 31%, el 58,7% tienen grado de instrucción secundaria, el 81,7% refiere no haber tenido contacto epidemiológico, el 73,8% refiere que nunca ha recibido tratamiento anti-tuberculosis, solo el 32,5% presenta alguna comorbilidad, dentro de este grupo la comorbilidad más frecuente encontrada fue el VIH con un 14,3%, el 78,6% presentó la localización pulmonar, el 21,4% presentó localización extrapulmonar, la afección pleural fue la más frecuente con 48,1%, el método diagnóstico más empleado fue el Bk con un 69%, el esquema de tratamiento más empleado es el esquema uno con un 74,6%. **Conclusiones:** Dentro de las características clínicas y epidemiológicas asociadas a la tuberculosis muestra que el sexo más afectado es el masculino, la comorbilidad más frecuente es el VIH, la localización más frecuente es la pulmonar, el método de diagnóstico más empleado es el Bk, y el tratamiento más empleado es el esquema uno.

Palabras clave: Tuberculosis, características clínicas, características epidemiológicas.