

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS SEPSIS  
NEONATAL EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E.  
BERNALES DURANTE EL PERÍODO ENERO-  
DICIEMBRE 2016.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**MARLENY CAROLINA LÉVANO CHÁVARRY**

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**-2017-**

## RESUMEN

**INTRODUCCIÓN:** Dentro de las situaciones adversas a las que se enfrenta un neonato se encuentra la Sepsis, ésta se entiende como aquella situación clínica derivada de la invasión y proliferación de agentes infecciosos en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. **OBJETIVO:** Determinar los factores de riesgo asociados a sepsis neonatal. **METODOLOGÍA:** Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, analítico retrospectivo de tipo caso control, en aquellos neonatos nacidos en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales que fueron ingresados al servicio de Neonatología con el cuadro clínico y diagnóstico de Sepsis neonatal durante el periodo Enero- Diciembre 2016. **RESULTADOS:** Se comparó un grupo 162 casos (recién nacidos con el diagnóstico de Sepsis Neonatal) con 169 controles (recién nacidos sanos). El promedio de edades maternas en los casos fue de 27.19(DE=8.04) y 26.05(D.E=6.39) en los controles ( $p=0.000$ ); se halló diferencia significativa entre controles prenatales ( $p=0.000$ ) (OR=10.777), fiebre al momento del parto ( $p=0.000$ ) (OR=2.199), infección de vías urinarias ( $p=0.000$ ) (OR=2.471), ruptura prematura de membranas prolongada ( $p=0.000$ ) (OR=12.833), corioamnionitis ( $p=0.000$ ) (OR= 10.755), el tipo de parto por cesárea ( $p=0.000$ ) (OR=4.099), sexo del recién nacido ( $p=0.249$ ) (OR=0.776). **CONCLUSIONES:** Se concluye que los factores maternos asociados a sepsis neonatal fueron: Controles prenatales insuficientes, fiebre materna durante el parto, infección de vías urinarias, corioamnionitis, rotura prematura de membranas prolongado y el tipo de parto por cesárea. No se hallaron factores neonatales asociados a sepsis neonatal.

**PALABRAS CLAVE:** Sepsis neonatal, factores de riesgo.