

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**PRINCIPALES INDICACIONES DE PARTO POR
CESÁREA EN MUJERES GESTANTES ATENDIDAS
EN EL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO
E. BERNALES, EN EL PERIODO 2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ADELÍ ABIGAIL SÁNCHEZ LUNA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Identificar las principales indicaciones de parto por cesárea en mujeres gestantes atendidas en el departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en el periodo 2016.**Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal de diseño cuantitativo. La población estuvo constituida por 2896 mujeres gestantes que culminaron su gestación por cesárea, por lo cual se tomó una muestra representativa de 340 mujeres gestantes con un nivel de confianza de 95% y con un margen de error del 5%. La información fue recolectada de las historias clínicas en una ficha de recolección de datos, para el análisis estadístico se utilizó el programa de SPSS en su versión 23.0.**Resultados:** Se estima que las mujeres que culminaron su gestación por cesárea represento un 51%.La frecuencia de cesárea por emergencia fue un 54%. Se encontró que el 30% estaba en el rango de edad de 21-26 años, tuvieron estudios secundarios el 91.2% y el 74.1% fueron convivientes. También se pudo obtener que el 65.6% pertenecía al rango de 38-41 semanas de edad gestacional, el 65.9% fueron multigestas y se evidencio controles prenatales adecuados en un 62.4%.En las pacientes de nuestro estudio se pudo identificar que la indicación más frecuente para parto por cesárea fue por causa materna representando el 47%, de las cuales el 47,8% fue por cesareada anterior. Entre las indicaciones por causa fetal y ovular resultaron que 30.9% fue por sufrimiento fetal agudo y el 38% por distocia funicular respectivamente. **Conclusiones:** La frecuencia de los partos por cesárea es elevada en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, sobrepasando los porcentajes establecidos por la OMS. La indicación más habitual de cesárea fue por causa materna y entre estas la primordial fue cesárea anterior.

Palabras claves: parto por cesáreas, principales indicaciones, causa materna, fetal y ovular.