

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERISTICAS CLINICAS Y PRONOSTICO DE  
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS  
HEPÁTICA HOSPITALIZADOS EN HOSPITAL NACIONAL  
SERGIO BERNALES PERIODO ENERO DEL 2014 A  
DICIEMBRE 2015.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**MUNAYLLA AYALA GUSTAVO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**INTRODUCCIÓN:** Es una enfermedad crónica con mayor incidencia de mortalidad en la población mundial, cuyas etiologías más importantes son de tipo alcohólica, virus de la hepatitis B y C, y esteatosis hepática no alcohólica.

**MATERIALES Y MÉTODOS:** Se empleó el método descriptivo, retrospectivo, y 101 pacientes se incluyen para el estudio, con una muestra de 82 casos.

**RESULTADOS:** se atendieron un promedio de 50 pacientes al año, con una edad mediana de 60,5 años de edad para ambos géneros, (masculino 74.3% y femenino 25.7%). La etiología de la cirrosis hepática fue el alcoholismo en 46,3%, seguida de etiología por virus de hepatitis B en un 11%. Las complicaciones se presentó el 84,1% de las cuales, predominó los procesos infecciosos con el 18,3% (respiratorias (8,3%), digestiva (15,8%) y urológico (34,1%)), el 53,7% de pacientes presentó estadio B de la clasificación de Child-Pugh, y Modelo MELD una mediana de 20 puntos. El tiempo de supervivencia global se estableció una Mediana de 43.3 meses de vida.

**DISCUSIÓN:** la edad mediana fue 60,5 años para ambos géneros, como dice Parra V y Raymundo R (31) et al que la mediana de edad reportada fue 64 años. *Jara N y Puican N (14) et al* en su trabajo reporta que la etiología más frecuente fue el consumo crónico de alcohol fue responsable del 28% de casos, seguida de la hepatitis viral B (15,2%), En relación a las complicaciones fue los procesos infecciosos con 18,3%, *Valenzuela V(34) et al* encontró que las complicaciones intrahospitalarias fueron: resangrado 26%, hemorragia digestiva alta 14,6%, neumonía 18,7%, infección de partes blandas 5,2%, infección del tracto urinario 4,1%, lo cual coincide con lo hallado en el presente trabajo.

**Conclusiones:** se identificó 50 casos en promedio al año. Se evidencio que el factor desencadenante de la cirrosis hepática fue el alcoholismo en 46,3%, seguida de etiología por virus de hepatitis B en un 11% y complicación de las cuales predominó las infecciones 18,3%. se estableció como mediana del tiempo de supervivencia global de 43,3 meses.

**Recomendación:** promover la cultura de prevención en la salud pública, por medio de la vacunación anti hepatitis B, evitar el consumo temprano de alcohol, crear centros de rehabilitación para personas con alcoholismo.

**Palabras claves:** Cirrosis hepática, enfermedad crónica, Child-Pugh, Meld.