

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS
GASTROENTERITIS AGUDAS Y SU RELACIÓN CON
EL TIPO DE PLAN DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE
REHIDRATACIÓN ORAL EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO
UNANUE DE NOVIEMBRE 2014 - NOVIEMBRE 2015.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
NORMA KARINA RAMIREZ MAMANI**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2017**

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar las características clínicas de las gastroenteritis agudas y su relación con el tipo de plan de atención en la Unidad de Rehidratación Oral en pacientes pediátricos del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo de noviembre 2014 - noviembre 2015.

MATERIALES Y METODO: Se realizó un estudio de tipo Retrospectivo – Transversal – Observacional– Descriptivo - Correlacional. Fueron seleccionados 1344 pacientes, quienes fueron atendidos en los meses de noviembre del 2014 a noviembre de 2015. Se realizó la recolección de datos, a través de las fichas de atención registradas según el plan de atención de la Unidad de Rehidratación Oral (URO) del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

RESULTADO: Se encontró que las características clínicas de humedad de boca y lengua estuvieron presentes en el 95% de los pacientes, en el 94.3% de los pacientes se utilizó el Plan A, el grupo etario más afectado por las gastroenteritis agudas fue el de los lactantes con 60.7% de los casos, la mayoría de pacientes que comprende el 44.4%, provienen del distrito El Agustino, la frecuencia de vómitos >4 al día fue significativo ($p= 0.02$) para producir deshidratación, mientras que la frecuencia de diarreas >5 al día no tuvo significancia ($p= 0.771$) como factor de deshidratación, por ultimo las características clínicas de las gastroenteritis agudas fueron estadísticamente significativas con el Plan de atención brindado en la URO.

CONCLUSIONES: Existe un alto índice de Gastroenteritis agudas (GEA) sobretodo en los lactantes (1 a 24 meses) , en nuestro estudio la frecuencia de diarrea no tuvo significancia con el plan de atención, es decir no se relaciona directamente con la deshidratación de los pacientes; a pesar de la gran prevalencia de GEA, un 94.3% no tuvo deshidratación, lo cual tuvo correspondencia con las características clínicas al ingreso, por tal motivo, fueron tratados con plan de atención el Plan A.

PALABRAS CLAVE: Características clínicas, Gastroenteritis agudas, Plan de atención.