

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**FACTORES ASOCIADOS A LA IDEACIÓN SUICIDA EN  
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
Nº 6090 JOSÉ OLAYA BALANDRA CHORRILLOS  
NOVIEMBRE 2015**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**MORGAN BRONCANO SHEYLA MONICA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

El suicidio es considerado como la única conducta destructiva en que agresor y víctima se identifican y es una de las más frecuentes causas de muerte en la adolescencia. El objetivo general es determinar los factores asociados a la ideación suicida presentes en los estudiantes adolescentes del 3ro, 4to. 5to de la I.E N° 6090 José Olaya Balandra Noviembre 2015. El estudio es de enfoque cuantitativo, prospectivo, descriptivo y transversal. Se elaboró un instrumento estructurado tipo cuestionario a los estudiantes de la I.E, con una población de 91 alumnos. El diseño de la encuesta fue no probabilístico. Resultado: La ideación suicida en los adolescentes está ausente en el 64% y presente en el 36 %. Los factores asociados están presentes en los adolescentes, siendo del factor psicológico el 91%, factor familiar 64%, y ausente en el factor social con 61%. El factor psicológico predomina en adolescentes con ideación suicida, donde la percepción baja de sí mismo se encuentra en el 94%, problemas de afrontamiento y resolución de problemas en 91% y pensamiento de desesperanza en 73%. En el factor familiar, el déficit de la comunicación está presente en el 85%, la disfunción familiar 79% y la conducta familiar autoritaria 76%. Conclusiones: Este es un problema que debe ser abordado de manera preventiva con la intervención de la enfermera escolar y derivarse a los profesionales de salud mental de manera prioritaria, cuando se considere necesario.

**PALABRAS CLAVE:** Ideación suicida, factores asociados, adolescentes